

Листно торене –

Оптимално снабдяване с хранителни вещества през листата

Листното торене осигурява ефективно и бързо снабдяване с хранителни вещества за жизнени култури, високо качество на плодовете и удължен период на съхранение.

Климатичните промени оставят своя отпечатък върху отглеждането на семкови плодове. Слънчевите пригори се случват много по-често, отколкото преди 10 години. Водата, която определя не само броя на плодовете на дърво, но и по същество размера на плодовете, често липсва. Това води и до по-чест недостиг на хранителни вещества. Дори ако този недостатък първоначално не е видим, първо това се отразява на качеството на плодовете, а по-късно и на производителността на дърветата.

Авитар® – с три силни действия!

Уникална формула от три естествени съставки



*Тюрингия 2020 г.

Ние ще се радваме да Ви помогнем!

Как да се свържете с нас:



064 988 041

Нашият екип на телефона за консултации с удоволствие ще Ви помогне.



www.lebosol.bg

Изпратете ни съобщение, използвайки нашата форма за контакт.



office@lebosol.bg

Напишете ни имейл.



Изтеглете сега - приложението Lebosol®!

Актуални и ексклузивни резултати от тестове, видеоклипове за работа с продуктите и много други.

Предлага се в Google Play и App Store.

Можете да ни намерите и онлайн чрез нашите канали в социалните медии:



www.lebosol.bg

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 · 5800 Плевен · Телефон: 064 988 041 · office@lebosol.bg

© Copyright Lebosol® Dünger GmbH 2025 –

Всички съдържания, особено текст, снимки и графики са със защитени авторски права. Всички права относно размножаването, публикуването, обработката и превода, са запазени.

Семкови плодове · Семкови плодове · Семкови плодове



Lebosol

Повече от 30 години опит в храненето на растенията

Листно торене при семкови плодове

Оптимално снабдяване с хранителни вещества

sustainable plant nutrition



Нашите препоръки за оптимално снабдяване с хранителни вещества при семкови плодове:

Цел	Препоръка	Момент						
		Червена пъпка	Балон	Край на цъфтежа	Размер на лешник	Размер на орех	Готовност за бране	След бране
✓ Намаляване на ръждата ✓ Залагане на плодове ✓ Размер и оцветяване на плодовете	Аминозол® 	2 пъти 150 – 750 мл/дка						2 пъти 150 мл/дка
✓ Качество на цветовете ✓ Залагане на плодове ✓ Транспорт на калций	Лебозол®-Цинк 700 СК + Лебозол®-Робустус СК	2 – 4 пъти 25 – 50 мл/дка + 150 - 200 мл/дка						2 пъти 50 мл/дка + 200 мл/дка
✓ Повече жизненост (напр. при студ по време на цъфтеж)	Аминозол® + Лебозол®-Робустус СК + Лебозол®-Калий 450	1 – 2 пъти 150 - 200 мл/дка + 150 - 200 мл/дка + 300 - 500 мл/дка						
✓ Намаляване на пригорите ✓ Качество на листата ✓ Зелен цвят на фона	Лебозол®-Манган 500 СК 	2 – 4 пъти 50 – 100 мл/дка						
✓ Фотосинтеза ✓ Срещу преждевременно опадане на листата ✓ Качество на листата	Лебозол®-Магнезий 400 СК 	1 – 2 пъти 200 – 500 мл/дка				2 – 3 пъти 200 – 500 мл/дка		
✓ Намаляване на стреса от суша ✓ Стабилност при съхранение и транспорт	Лебозол®-Силиций		2 – 4 пъти 50 - 100 мл/дка					
✓ Качество на обвивката, оцветяване ✓ Намаляване на пригорите	Авитар® 			3 – 4 пъти 400 – 600 мл/дка				
✓ Твърдост на плодовете ✓ Стабилност при съхранение и транспорт	Лебозол®-Калций-Форте СК			4 – 6 пъти 300 – 800 мл/дка				
✓ Оцветяване на плодове ✓ Твърдост и размер на плодовете ✓ Зимоустойчивост	Лебозол®-ПК-Макс					2 – 4 пъти 300 – 800 мл/дка		

Топ 3 най-популярни продукта на Лебозол® при отглеждане на семкови плодове:



Авитар®

Органичен NK тор с антистресов ефект.
Съставки:
47 гр/л N, 24 гр/л K₂O



Лебозол®-Калций

Богат разтвор на калциев хлорид за твърди плодове.
Съставки:
220 гр/л CaO



Лебозол®-Робустус СК

Хранителната смес за здрави растения
Съставки:
25 гр/л N, 215 гр/л CaO,
100 гр/л B, 25 гр/л MgO

Обяснено накратко – елементи и техните ключови функции в семковите плодове

- ✓ Растенията, които не са достатъчно снабдени с хранителни вещества, са по-податливи на болести. Листното торене осигурява ефективно и бързо снабдяване с хранителни вещества.
- ✳ Калият засилва устойчивостта на суша и измръзване. Той също играе важна роля за оцветяването и размера на плодовете.
- ✳ Фосфорът осигурява добив, подобрява качеството на плодовете и е важен за оцветяването.
- ✳ Калцийт е основен компонент за стабилизирането на клетъчните стени и клетъчните мембрани, и следователно за качеството на плодовете.
- ✳ Борът е важен за качеството на цветовете, завръза на плодове и устойчивостта на цветовете на замръзване. Той подпомага усвояването на калций. По този начин допринася за повишаване на стабилността при съхранение.
- ✳ Магнезият насърчава усвояването на фосфора и активизира фотосинтезата.
- ✳ Цинкът е важен за качеството и растежа на цветовете. Той прави растенията по-устойчиви на радиационен стрес (по-малко слънчеви пригори).
- ✳ Манганът подобрява използването на наличния азот и прави растенията са по-устойчиви на сухи периоди и радиационен стрес.
- ✳ Всъщност силицийт не е хранително вещество. Въпреки това, той подпомага дърветата в регулирането на водния им баланс и насърчава усвояването на фосфор и калций.

