



Продуктова информация



Lebosol® - Амониум ТС 200

ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ТЕЧЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ,
N(S) тор, 15(+21) в разтвор

15 % общ азот (200 гр/л N) (9,3 % амониев азот; 5,7 % амиден азот)
21,3 % сяра, водоразтворима (280 гр/л S)

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	за снабдяване с азот и сяра, жизненост, качество на листото, добив, маслено съдържание, фотосинтетичен капацитет	0,500 л/дка ((в 20 - 40 л вода) 0,5 -1%-ен р-р при нормални култури, 0,25 - 0,5%-ен р-р при чувствителни култури под стъкло/фолио (да не се прилага по време на цъфтеж))	при необходимост
При всички култури	за снабдяване с азот и сяра, жизненост, качество на листото, добив, маслено съдържание, фотосинтетичен капацитет	капково	Попитайте вашия специалистконсултант!

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	за снабдяване с азот и сяра	0,500 л/дка (При листно торене в най-малко 20 - 40 литра вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,5 %-тен разтвор.)	при необходимост
Житни култури	усвояване на азот, съдържание на протеин, качество	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	от 3-ти лист
Житни култури	добив, жизненост	1 - 2 пъти 0,500 л/дка	от братене
Житни култури	добив, съдържание на протеин, качество	1 - 2 пъти 0,500 л/дка	при изкласяване
Пасища и ливади	добив, усвояване на азот, жизненост	2 - 5 пъти 0,500 л/дка	по време на вегетационния период
Пасища и ливади	Усвояване на азот, жизненост	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	по време на вегетационния период
Картофи	Усвояване на азот, жизненост	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	от началото на оформяне на реда
Бобови култури	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ), съдържание на протеин	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Царевица	Усвояване на азот, жизненост	1 - 2 пъти 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Рапица	усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Рапица	добив, маслено съдържание	2 - 3 пъти 0,500 л/дка	между 6-ти лист и начало на цъфтеж

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Слънчоглед	усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание	1 - 2 пъти 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Слънчоглед	добив, маслено съдържание	2 - 3 пъти 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Захарно цвекло	Усвояване на азот, жизненост	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Захарно цвекло	добив, усвояване на азот, жизненост, образуване на захари	1 - 3 пъти 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Зелеви, листни и лукови зеленчуци	добив, качество	2 - 3 пъти 0,500 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци	усвояване на азот, съдържание на протеин, качество	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	усвояване на азот, съдържание на протеин, качество	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	добив, дълготрайност, усвояване на азот, качество, жизненост	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Хмел	Усвояване на азот, жизненост	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	0,5 м височина до беритба
Тревни настилки	Усвояване на азот, жизненост	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	по време на вегетационния период
Памук	Усвояване на азот, жизненост	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Ориз	усвояване на азот, съдържание на протеин, качество	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	от 3-ти лист

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition

