



MADE IN
GERMANY

Lebosol

Продуктова информация

Lebosol® - Авитар®

Органичен NK-тор, течен

4 + 2 със силата на аминокиселини, растителни вещества от водорасли (*Ascophyllum nodosum*), хуминови киселини, фулвинови киселини

Хранителни вещества: 4,1 % общ азот (47 г/л N); 2,1 % общ калиев оксид (24 г/л K₂O)
Допълнително се съдържат: 25,8 % органична субстанция

Растенията, които са недостатъчно снабдени с хранителни вещества са повече предразположени към болести. Листното торене осигурява ефективно и бързо снабдяване с хранителни вещества.

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	Устойчивост на стрес, корено-образуване, воден баланс, фотосинтеза, добив	1 - 6 пъти 0,2 - 0,5 л/дка(при ръчна пръскачка 1- 2 %-ен разтвор.)	при необходимост
При всички култури	Третиране на посевния материал за по-добро коренообразуване и начално развитие	2 - 5 л/т посевен материал	При третиране на семената/разсада с хранителни вещества
При всички култури	Подпомагане на хранителния баланс и процесите на преобразуване на растителни остатъци на полето	0,5 - 1 л/ дка	При необходимост

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	Устойчивост на стрес, добив, воден баланс, коренообразуване, фотосинтеза, намаляване на стреса от слънчева радиация (антиоксидант)	Фертигация	Попитайте Вашия професионален консултант!
Житни	Подобрен прием на хранителни вещества, устойчивост, усвояване на азот, жизненост	2 - 4 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От 3-ти лист
Картофи	Подобрен прием на хранителни вещества, устойчивост, жизненост, качество на листа, по-бързо начално развитие	2 - 4 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	от 6-ти лист
Бобови	Подобрен прием на хранителни вещества, качествени листа и цъфтеж, устойчивост, добив	1 - 2 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От 6-ти лист
Рапица	Подобрен прием на хранителни вещества и устойчивост на стрес, намаляване на стреса от слънчева радиация	2 - 3 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От 4-ти лист
Царевица	Подобрен прием на хранителни вещества и устойчивост, бързо начално развитие	1 - 2 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От 4-ти лист
Слънчоглед	Подобрен прием на хранителни вещества и устойчивост на стрес, по-малко стрес от слънчева радиация (антиоксидант)	1 - 2 пъти 0,2-0,4 л/дка	От 4-ти лист
Ягоди	Завръз, качество, по-малко стрес от радиация (сл. пригор)	2 - 4 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	След засаждане или след раззеленяване



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Семкови	Завръз, хубава обвивка и цвят, по-малко стрес от слънчева радиация (слънчев пригор)	3 - 4 пъти 0,4 - 0,6 л/дка	След цъфтеж
Костилкови	Качествен цъфтеж и завръз, по-малко стрес от радиация	2 - 3 пъти 0,3 - 0,5 л/дка	След цъфтеж
Храстовидни	Качествен цъфтеж и завръз, по-малко стрес от радиация	2 - 3 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От летораста
Десертно грозде	Качествен цъфтеж и завръз, по-малко стрес от радиация	3 - 5 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От нарастване на цветовете
Цитруси	Завръз, качество, по-малко стрес от слънчева радиация	2 - 4 пъти 0,3 - 0,5 л/дка	От бяла пъпка до беритба
Винено грозде	Качествен цъфтеж и завръз, по-малко стрес от радиация	3 - 5 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От нарастване на цветовете
Зеленчуци	Подобрен прием на хранителни вещества, качествени листа и цъфтеж, добив	2 - 4 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	При достатъчно развита листна маса
Билки, етерични, подправки	Подобрен прием на хранителни вещества, качествени листа и цъфтеж, добив	1 - 3 пъти 0,3 - 0,5 л/дка	При достатъчно развита листна маса
Коледни дръвчета	Подобрен прием на хранителни вещества, устойчивост, жизненост, коренообразуване	1 - 3 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От летораста
Тревни настилки	Подобрен прием на хранителни вещества, устойчивост, жизненост, коренообразуване	2 - 5 пъти 0,3 - 0,5 л/дка	По време на вегетация
Памук	Подобрен прием на хранителни вещества, устойчивост, жизненост, коренообразуване	2 - 4 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От летораста

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Памук	Подобрен прием на хранителни вещества, устойчивост, жизненост, коренообразуване	2 - 4 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От летораста
Декоративни	Подобрен прием на хранителни вещества, устойчивост, жизненост, коренообразуване	1 - 3 пъти 200 - 300 мл (на 100 л вода 0,2 - 0,4 л/дка)	При достатъчно развита листна маса
Хмел	Подобрен прием на хранителни вещества, устойчивост, жизненост, коренообразуване	3 - 5 пъти 0,2 - 0,4 л/дка	От височина 0,5 м

