



Продуктова информация

Lebosol® - Цинк 700 СК

ЕДНОКОМПОНЕНТЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ

Суспензия на тор с микроелемент

40 % общ цинк под формата на оксид (700 гр/л Zn)

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	за снабдяване с цинк	0,025 - 0,100 л/дка (При листно торене в най-малко 20 л вода. При ръчно пръскане 0,25 %-ен разтвор.)	при необходимост
При всички култури	Снабдяване на посева с хранителни вещества за по-добро начално развитие и жизненост	0,5 - 2 л/т	За третиране на посева и растението
При всички култури	За снабдяване с цинк, фитохормонен баланс, качество на листото, оплождане, добив, енергиен баланс, фотосинтетичен капацитет, намаляне на радиационния стрес (антиоксиданти)	Повече приложения с 0,025 - 0,200 л/дка (В най-малко 20 л.вода. При пръскане с гръбна/ръчка пръскачка 0,25 %ен р-р)	при необходимост
Житни култури	добив, усвояване на азот, устойчивост при презимуване	0,050 - 0,100 л/дка (Препоръка за есенно-житни култури)	през есента от 3-ти лист

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Житни култури	добив, усвояване на азот, качество, устойчивост на стрес	0,050 - 0,100 л/дка (препоръка за есенно-житни култури)	през пролетта от начало на вегетация
Житни култури	братене, добив, усвояване на азот, устойчивост	2 пъти 0,050 - 0,100 л/дка (препоръка за пролетни житни култури)	от 3-ти лист
Житни култури	Усвояване на азот, качество на цъфтежа, оплождане, толерантност към стрес, жизненост	1 - 3 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	от 3-ти лист
Пасища и ливади	Усвояване на азот, жизненост, толерантност към стрес	2 - 5 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	по време на вегетационния период
Картофи	качество на листото, добив, фотосинтеза, устойчивост на стрес	0,100 л/дка	от 4-ти лист
Картофи	Усвояване на азот, бързо начално развитие, качество на обелката, толерантност към стрес	2 - 4 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	от началото на оформяне на реда
Бобови култури	начално развитие, качество на листото, устойчивост на стрес	1 - 2 пъти 0,050 л/дка	от 6-ти лист
Бобови култури	Усвояване на азот, качество на цъфтежа, оплождане, толерантност към стрес, жизненост	2 - 3 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	от 6-ти лист
Царевица	Усвояване на азот, качество на цъфтежа, оплождане, толерантност към стрес, жизненост	1 - 2 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	от 4-ти лист
Царевица	добив на зърно, качество	0,100 л/дка	от 4-ти лист
Рапица	Усвояване на азот, качество на цъфтежа, оплождане, толерантност към стрес, жизненост	2 - 3 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	от 4-ти лист
Слънчоглед	добив, устойчивост на стрес, резистентност	0,050 - 0,100 л/дка	от 4-ти лист

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Слънчоглед	Усвояване на азот, качество на цъфтежа, оплождане, толерантност към стрес, жизненост	1 - 2 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	от 4-ти лист
Захарно цвекло	Усвояване на азот, жизненост, толерантност към стрес	1 - 3 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	от 6-ти лист
Ягоди	качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода	2 пъти 0,025 л/дка	зелена пъпка до прецъфтяване
Ягоди	Качество на цъфтежа, транспортиране на калций, образуване на витамини, завръз на плодове, качество на плода	2 - 4 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	от зелена пъпка
Ягоди	залагане на цветни пъпки, качество на цвета, устойчивост при презимуване	0,100 л/дка	през есента при засаждане
Семкови плодове	качество на цветните пъпки, транспорт на калций, качество на обвивката	2 пъти 0,025 л/дка	завръз на плодове до беритба
Семкови плодове	Качество на цъфтежа, транспортиране на калций, образуване на витамини, завръз на плодове, качество на плода	2 - 4 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	Червени пъпки
Семкови плодове	качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода	2 пъти 0,025 л/дка	от червена пъпка до прецъфтяване
Костилкови плодове	качество на цветните пъпки, транспорт на калций, качество на обвивката	2 пъти 0,025 л/дка	след цъфтеж до беритба
Костилкови плодове	Качество на цъфтежа, транспортиране на калций, образуване на витамини, завръз на плодове, качество на плода	2 - 4 пъти 0,025-0,100 л/дка	от завръз на плодове

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Храстовидни плодове	качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода	2 пъти 0,025 л/дка	от начало на развитие на леторастите до цъфтеж
Храстовидни плодове	Качество на цъфтежа, транспортиране на калций, образуване на витамини, завръз на плодове, качество на плода	2 - 4 пъти 0,025-0,100 л/дка	При започване растежа на леторастите
Десертно грозде	Качество на цъфтежа, транспортиране на калций, завръз на плодове, качество на плода, равномерно съзряване	2 - 4 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	видими леторастите
Десертно грозде	качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода	2 пъти 0,025 л/дка	от уголемяване на разклоненията до начало на цъфтеж
Овошки	качествен цъфтеж, възстановяване, натрупване на хранителни резерви, студоустойчивост	2 пъти 0,050 л/дка	след беритба
Винено грозде	Качество на цъфтежа, транспортиране на калций, завръз на плодове, качество на плода, равномерно съзряване	2 - 4 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	видими леторастите
Винено грозде	качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода	2 пъти 0,025 л/дка	от уголемяване на разклоненията до начало на цъфтеж
Плодни зеленчуци	качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода	2 - 3 пъти 0,050 л/дка	от първи видими цветни пъпки
Зелеви, листни и лукови зеленчуци	транспорт на калций, вътрешно качество, образуване на витамини	1 - 3 пъти 0,050 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Аспержи	транспорт на калций, вътрешно качество, образуване на витамини	2 - 3 пъти 0,050 л/дка	при достатъчно развита листна маса

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Кореноплодни и клубеноплодни зеленчуци	транспорт на калций, вътрешно качество, образуване на витамини	1 - 3 пъти 0,050 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци	Усвояване на азот, качество на цъфтежа, завръз на плодове, транспортиране на калций, вътрешно качество, образуване на витамини	2 - 4 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури	Качество на цъфтежа, транспортиране на калций, образуване на витамини, завръз на плодове, качество на плода	2 - 4 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	От бели пъпки до беритба
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода	2 - 3 пъти 0,050 л/дка	от първи видими цветни пъпки
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	Усвояване на азот, качество на цъфтежа, завръз на плодове, качество на плода, транспортиране на калций, вътрешно качество	2 - 4 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Хмел	Усвояване на азот, качество на цъфтежа, завръз на плодове	1 - 4 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	0,5 м височина до беритба
Хмел	развитие на пъпки и леторасти, качество	3 - 5 пъти 0,030 - 0,050 л/дка	от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Тютюн	Усвояване на азот, жизненост, толерантност към стрес	1 - 3 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	от 4-ти лист
Коледни дръвчета	Усвояване на азот, жизненост, толерантност към стрес	2 - 3 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	от разлистване
Декоративни растения	качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове	2 пъти 0,025 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Декоративни растения	Качество на листото и цъфтежа, усвояване на азот, толерантност към стрес, жизненост	2 пъти 0,05 л/дка	при достатъчно развита листна маса

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Тревни настилки	Усвояване на азот, жизненост, толерантност към стрес	2 - 5 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	по време на вегетационния период
Ядки	Качество на цъфтежа, транспортиране на калций, образуване на витамини, завръз на плодове, качество на плода	2 - 5 пъти 0,025 - 0,100 л/дка	От набъбване на пъпки
Памук	Качество на цъфтежа, транспортиране на калций, завръз на плодове, качество, зимостойчивост	2 - 3 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	от разлистване
Ориз	Усвояване на азот, качество на цъфтежа, оплождане, толерантност към стрес, жизненост	1 - 3 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	от 3-ти лист

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition

