



Продуктова информация



Lebosol® - ФрутМикс СК

СЛОЖЕН ТЕЧЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ,
Mg тор с микроелементи (+25); в суспензия

24,9 % общ магнезиев оксид (380 гр/л MgO)
4,9 % общ манган като манган-карбонат (75 гр/л Mn)
4,3 % общ цинк като цинков оксид (65 гр/л Zn)

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	за снабдяване с магнезий	0,300 - 0,500 л/дка (При листно торене в най-малко 20 литра вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,5 %-тен разтвор)	при необходимост
При всички култури	за снабдяване с магнезий, манган и цинк, качество на листото, добив, воден баланс, фотосинтетичен капацитет, намаляне на радиационния стрес (антиоксиданти)	0,300 - 0,500 л/дка (При листно торене в най-малко 20 литра вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,5 %-ен разтвор. Не по време на цъфтеж.)	при необходимост
Житни култури	съдържание на протеин и качество на зърното, добив, усвояване на азот	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от изкласяване

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Житни култури	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	през пролетта от начало на вегетация до изкласяване
Пасища и ливади	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	по време на вегетационния период
Картофи	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от началото на оформяне на реда
Картофи	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Бобови култури	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Бобови култури	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Царевица	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Рапица	добив, маслено съдържание, качество на листото, фотосинтеза	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	през пролетта от начало на вегетация до начало на зреене
Слънчоглед	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Захарно цвекло	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Ягоди	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 3 пъти 0,300 - 0,400 л/дка	от стадия на залагане на плодни пъпки до беритба
Ягоди	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от зелена пъпка
Семкови плодове	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 4 пъти 0,3 - 0,4 л/дка (при предразположените към ръжда сортове едва от големина на орех)	в края на цъфтежа
Семкови плодове	качество на листото, жизненост, фотосинтеза	2 - 3 пъти 0,200 - 0,400 л/дка	от зелена пъпка до края на цъфтежа

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Семкови плодове	Качество на листото, жизненост, фотосинтетичен капацитет	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	Червени пъпки
Костилкови плодове	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от завръз на плодове
Костилкови плодове	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 3 пъти 0,300 - 0,400 л/дка	от завръз на плодове до беритба
Храстовидни плодове	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 4 пъти 0,300 - 0,400 л/дка	преди цъфтеж до беритба
Храстовидни плодове	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от нарастване на леторастите
Десертно грозде	качество на листото, фотосинтеза, предотвратяване на кафяво гниене	2 - 5 пъти 0,300 - 0,400 л/дка	от развитие на леторасти до затваряне на чепката
Десертно грозде	качество на листото, фотосинтеза, предотвратяване на кафяво гниене	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от развитие на леторасти до затваряне на чепката
Винено грозде	зеленина и качество на листото, фотосинтеза, срещу кафяво гниене	2 - 5 пъти 0,300 - 0,400 л/дка	от развитие на леторасти до затваряне на чепката
Винено грозде	качество на листото, фотосинтеза, предотвратяване на кафяво гниене	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от развитие на леторасти до затваряне на чепката
Зеленчуци	качество на листото, жизненост, фотосинтеза	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от бели пъпки

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	Качество на листото, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	зеленина и качество на листото, добив, фотосинтеза	2 - 3 пъти 0,300 - 0,400 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Хмел	Качество на листото, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Хмел	зеленина и качество на листото, добив, фотосинтеза	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Тютюн	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Тютюн	качество на листото, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Коледни дръвчета	срещу преждевременно окапване на игличките, повече жизненост, качество на игличките, фотосинтеза	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	по време на вегетационния период
Декоративни растения	качество на листото, жизненост, фотосинтеза	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка (0,100 л/10 литра вода за пръскане.)	при необходимост
Тревни настилки	качество на листото, жизненост, фотосинтеза	1 - 5 пъти 0,300 - 0,400 л/дка	по време на вегетационния период
Ядки	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	при започване растежа на леторастите
Памук	качество на листото и влакната, усвояване на азот, засилване на толерантността към стрес	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от разлистване