



Продуктова информация



Lebosol® - Калфос

СЛОЖЕН ТЕЧЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ
NP (Ca) тор 3-24 (+4), в разтвор

3,2 % общ азот като амиден азот (40 гр/л N)

24,3 % общ фосфорен пентоксид във водоразтворима форма (315 гр/л P_2O_5)

Допълнително се съдържат: 4,2 % калциев оксид, водоразтворим (55 гр/л CaO)

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	за снабдяване с калций	0,400 - 0,800 л/дка (При листно торене в най-малко 50 л вода. При ръчно пръскане с 0,1 %-ен разтвор.)	при необходимост
При всички култури	За снабдяване с калций, твърдост на клетъчната стена, редуциране на радиационния стрес(Антиоксиданти) , подобряване качеството на плода и трайността при съхранение	0,400-0,800 л/дка (При листно торене в минимум 50 литра вода. При пръскане с ръчна пръскачка 1 % -ен разтвор.)	при необходимост

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	За снабдяване с калций, твърдост на клетъчната стена, редуциране на радиационния стрес(Антиоксиданти) , подобряване качеството на плода и трайността при съхранение	Капково	Попитайте вашия специалист-консултант!
Житни култури	Жизненост, здравина на стъблото	1 - 3 пъти 0,500 л/дка	От началото на братенето
Картофи	качество на грудките и обвивката, подобява трайността при съхранение	3 - 6 пъти 0,400 - 0,600 л/дка	при удебеляване на столоните
Картофи	качество на грудките и обвивката, подобява трайността при съхранение	2 - 6 пъти 0,500 - 0,800 л/дка	от началото на оформяне на реда
Бобови култури	Качество, трайност при съхранение и транспортиране	1 - 2 пъти 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Рапица	Жизненост, здравина на стъблото	1 - 3 пъти 0,500 - 0,800 л/дка	от 4-ти лист
Слънчоглед	Жизненост, здравина на стъблото	1 - 2 пъти 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Захарно цвекло	Качество, трайност при съхранение и транспортиране	1 - 3 пъти 0,500 - 0,800 л/дка	от 6-ти лист
Ягоди	Жизненост, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 4 пъти 0,400 - 0,800 л/дка	от зелена пъпка
Ягоди	твърдост на плода, стабилност при съхранение, имунитет	3 - 4 пъти 0,400 - 0,600 л/дка	между цъфтеж и беритба
Семкови плодове	твърдост на плода, стабилност при съхранение, имунитет	4 - 6 пъти 0,500 - 0,800 л/дка	след цъфтеж до беритба
Семкови плодове	Жизненост, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	4 - 6 пъти 0,400 - 0,800 л/дка	Червени пъпки

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Костилкови плодове	Жизненост, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 5 пъти 0,400 - 0,800 л/дка	от прецъфтяване
Костилкови плодове	твърдост на плода, стабилност при съхранение, имунитет	3 - 5 пъти 0,500 - 0,800 л/дка	след цъфтеж до беритба
Храстовидни плодове	Жизненост, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 4 пъти 0,400 - 0,800 л/дка	При започване растежа на леторастите
Храстовидни плодове	твърдост на плода, стабилност при съхранение, имунитет	3 - 4 пъти 0,400 - 0,600 л/дка	начало на цъфтеж до беритба
Десертно грозде	Жизненост, здравина на обелката, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 5 пъти 0,400 - 0,800 л/дка	от прецъфтяване
Десертно грозде	твърдост на плода, стабилност при съхранение, имунитет	3 пъти 0,600 л/дка	от големина на грахово зърно до беритба
Винено грозде	Жизненост, здравина на обелката, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 5 пъти 0,400 - 0,800 л/дка	от прецъфтяване
Винено грозде	твърдост на плода, стабилност при съхранение, имунитет	3 - 5 пъти 0,400 - 0,600 л/дка	от големина на грахово зърно до беритба
Плодни зеленчуци	срещу гниене на цветовете, твърдост на плода, стабилност при съхранение, имунитет	3 - 4 пъти 0,400 - 0,600 л/дка	от завръз на плодове
Зелеви, листни и лукови зеленчуци	срещу вътрешно гниене и листна некроза, повишава трайността при съхранение, имунитет	3 - 4 пъти 0,400 - 0,600 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Аспержи	качество, покачва стабилността при съхранение, резистентност	2 - 4 пъти 0,500 - 0,800 л/дка	при достатъчно развита листна маса

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Кореноплодни и клубеноплодни зеленчуци	трайност при съхранение, имунитет	3 - 4 пъти 0,400 - 0,600 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци	Жизненост, твърдост на плода, трайност при съхранение и транспортиране, срещу вътрешно гниене, листна некроза и гниене на цветовете в краищата	2 - 5 пъти 0,400 - 0,800 л/дка	при достатъчно развита листна маса или от прецъфтяване до беритба
Цитрусови култури	Жизненост, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 5 пъти 0,400 - 0,800 л/дка	от бели пъпки
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	твърдост на плода, стабилност при съхранение, имунитет	2 - 4 пъти 0,400 - 0,600 л/дка	от 10 - 14 дни след засаждане или след цъфтеж до беритба
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	Жизненост, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 5 пъти 0,400 - 0,800 л/дка	при достатъчно развита листна маса или от прецъфтяване до беритба
Декоративни растения	Жизненост, качество на листото, стабилност при транспортиране	1 - 3 пъти 0,400 - 0,600 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Ядки	Жизненост, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 4 пъти 0,400 - 0,800 л/дка	от прецъфтяване
Памук	Жизненост, стабилност на влакната	2 - 4 пъти 0,400 - 0,800 л/дка	от прецъфтяване
Ориз	Жизненост, здравина на стъблото	1 - 3 пъти 0,500 л/дка	От началото на братенето