



Продуктова информация



# Lebosol® - Калий 450

СЛОЖЕН ТЕЧЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ  
NK-тор 3-30 в разтвор

3 % общ азот като уреен азот (45 гр/л N)  
30 % калиев оксид, водоразтворим (450 гр/л K<sub>2</sub>O)

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	Повече жизненост (напр. слана по цветовете)	1 - 2 пъти 0,500 л/дка (Най-добро въздействие в комбинация с 0,200 л/дка Аминозол + 0,500 л/дка Робустус СК)	при необходимост
При всички култури	за снабдяване с калий	0,500 - 1 л/дка (При листно торене в най-малко 30 л вода. При ръчно пръскане 2 %-ен разтвор.)	при необходимост

Лебозол® България ООД  
ул. Метро 5 • 5800 Плевен  
телефон: 064 988 041  
info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	добив, подсилва устойчивостта на цвета срещу измръзване	1 - 2 пъти 0,500 л/дка (Най-добър ефект може да получите в комбинация с 0,200 л/дка Аминозол® + 0,100 л/дка Лебозол®-Робустус СК.)	при необходимост
При всички култури	За снабдяване с калий, качество на листото, добив, воден баланс, фотосинтетичен капацитет, повишаване толерантността на стрес (при студ и горещина), усвояване на азот	Капково	Попитайте вашия специалист-консултант!
При всички култури	За снабдяване с калий, качество на листото, добив, воден баланс, фотосинтетичен капацитет, повишаване толерантността на стрес (при студ и горещина), усвояване на азот	0,500 - 1 л/дка (При листно торене в 30л. вода. При апликация с гръбна пръскачка в 2%-ен р-р.)	при необходимост
Житни култури	усвояване на азот, жизненост, воден баланс	2 пъти 0,500 л/дка	от края на братене
Житни култури	Съдържание на протеин, толерантност към стрес, зимоустойчивост	2 - 3 пъти 0,500 - 1 л/дка	от 3-ти лист
Пасища и ливади	Жизненост, енергийно съдържание, зимоустойчивост	2 - 4 пъти 0,500 - 1л/дка	по време на вегетационния период
Пасища и ливади	добив, усвояване на азот, жизненост	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	по време на вегетационния период
Картофи	Намалява предразположеността към сини и черни петна, жизненост, толерантност към стрес	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	от 6-ти лист

#### Лебозол®България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Картофи	намалява предразположеността към сини/ черни петна, снабдяване с Калий	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	при залагане на грудките и след цъфтеж
Бобови култури	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ), съдържание на протеин	1 - 2 пъти 0,500 - 1 л/дка	от 6-ти лист
Царевица	усвояване на азот, жизненост, воден баланс	0,600 - 0,800 л/дка	от 8-ми лист
Царевица	Повече жизненост (напр. при студ), енергийно съдържание, толерантност към стрес	1 - 2 пъти 0,500 - 1 л/дка	от 4-ти лист
Рапица	усвояване на азот, жизненост, воден баланс	2 - 3 пъти 0,600 - 1 л/дка	между 6-ти лист и начало на цъфтеж
Рапица	Жизненост, толерантност към стрес, маслено съдържание, зимостойчивост	2 - 3 пъти 0,500 - 1 л/дка	от 4-ти лист
Слънчоглед	Жизненост, толерантност към стрес, маслено съдържание	1 - 2 пъти 0,500 - 1 л/дка	от 4-ти лист
Захарно цвекло	добив, усвояване на азот, жизненост, образуване на захари	2 - 3 пъти 0,600 - 1 л/дка	от 8-ми лист
Захарно цвекло	Жизненост, толерантност към стрес, образуване на захар	2 - 3 пъти 0,600 - 1 л/дка	от 6-ти лист
Ягоди	добив, твърдост на плода, големина на плода	2 - 3 пъти 0,500 л/дка	между завръз на плодове и беритба
Ягоди	Твърдост и големина на плода, образуване на захар, повече жизненост(напр. при студ)	2 - 3 пъти 0,500 л/дка	от завръз на плодове

### Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Семкови плодове	Твърдост и големина на плода, образуване на захар, повече жизненост (напр. при студ), червено оцветяване	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	от края на юнското окапване на плодовете
Семкови плодове	твърдост на плода, големина на плода, червено оцветяване	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	от юнското окапване на плодовете до беритба
Костилкови плодове	твърдост на плода, големина на плода, захарно съдържание	2 - 3 пъти 0,500 л/дка	завръз на плодове до беритба
Костилкови плодове	Твърдост и големина на плода, образуване на захар, повече жизненост(напр. при студ)	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	от завръз на плодове
Храстовидни плодове	Твърдост и големина на плода, образуване на захар, повече жизненост(напр. при студ)	2 - 4 пъти 0.500 - 1л/дка	от завръз на плодове
Храстовидни плодове	добив, твърдост на плода, големина на плода	2 - 3 пъти 0,500 л/дка	завръз на плодове до беритба
Десертно грозде	узряване на пръчките, качество, студоустойчивост, образуване на захари	1 - 2 пъти 0,500 л/дка	от затваряне на чепката до беритба
Десертно грозде	узряване на пръчките, качество, студоустойчивост, образуване на захари	2 - 3 пъти 0,500 л/дка	от големина на грахово зърно
Винено грозде	узряване на пръчките, качество, студоустойчивост, образуване на захари	2 пъти 0,500 л/дка	от затваряне на чепката до беритба
Винено грозде	узряване на пръчките, качество, студоустойчивост, образуване на захари	2 - 3 пъти 0,500 л/дка	от големина на грахово зърно
Зеленчуци	добив, дълготрайност, качество	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	при достатъчно развита листна маса

### Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Зеленчуци	Трайност, качество, повече жизненост(напр. при студ)	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури	Твърдост и големина на плода, повече жизненост (напр. при студ)	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	от завръз на плодове
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	добив, дълготрайност, качество	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	Трайност, качество, повече жизненост(напр. при студ)	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Хмел	добив, дълготрайност, качество	2 - 5 пъти 0,500 - 1 л/дка	от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Хмел	Трайност, качество, толерантност към стрес	2 - 5 пъти 0,500 - 1 л/дка	0,5 м височина до беритба
Тютюн	добив, дълготрайност, качество	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	от 4-ти лист
Тютюн	Трайност, качество на листото, толерантност към стрес	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Коледни дръвчета	Трайност, качество на игличките, толерантност към стрес, зимостойчивост	2 - 3 пъти 0,500 - 1 л/дка	при необходимост
Декоративни растения	Трайност, качество на листото, толерантност към стрес	1 - 4 пъти 0,500 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Тревни настилки	Жизненост, зимостойчивост	2 - 4 пъти 0,500 - 1л/дка	по време на вегетационния период

### Лебозол®България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Ядки	Твърдост и големина на плода, образуване на захар, повече жизненост(напр. при студ)	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	от завръз на плодове
Памук	Трайност, качество, толерантност към стрес, зимостойчивост	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Ориз	Жизненост, толерантност към стрес	2 - 3 пъти 0,500 - 1 л/дка	от 3-ти лист

**Лебозол® България ООД**

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition

