



Продуктова информация



Lebosol® - Калий ТС 340

СЛОЖЕН ТЕЧЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ
NK(S) тор 3-22(+15), в разтвор

3 % общ азот като амиден азот (45 гр/л N)
22,4 % калиев оксид, водоразтворим (325 гр/л K₂O)
15,2 % сяра, водоразтворима (220 гр/л S)

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	За снабдяване с калий и сяра, качество на листото, добив, воден баланс, фотосинтетичен капацитет, повишаване на толерантността към стрес, усвояване на азот	0,500 - 1 л/дка (При листно торене в най-малко 40 л. вода. При пръскане с гръбна/ръчна пръскачка с 1%-ен р-р. Не по време на цъфтежа)	при необходимост
При всички култури	за снабдяване с калий и сяра	0,600 - 1 л/дка (При листно торене в най-малко 40 литра вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 1 %-ен разтвор)	при необходимост

Лебозол® България ООД
ул. Метро 5 • 5800 Плевен
телефон: 064 988 041
info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	За снабдяване с калий и сяра, качество на листото, добив, воден баланс, фотосинтетичен капацитет, повишаване на толерантността към стрес, усвояване на азот	Капково	Попитайте вашия специалист-консултант!
Житни култури	добив, усвояване на азот, жизненост	2 пъти 0,600 л/дка	от края на братене
Житни култури	съдържание на протеин и качество на зърното, добив, усвояване на азот	1 - 2 пъти 0,600 л/дка	от изкласяване
Житни култури	Съдържание на протеин, толерантност към стрес, зимостойчивост	2 - 3 пъти 0,500 - 1 л/дка	от 3-ти лист
Пасища и ливади	Жизненост, енергийно съдържание, зимостойчивост	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	по време на вегетационния период
Пасища и ливади	добив, усвояване на азот, жизненост	2 - 5 пъти 0,600 - 1 л/дка	по време на вегетационния период
Картофи	намалява предразположеността към сини/ черни петна	2 - 3 пъти 0,600 - 1 л/дка	при залагане на грудките и след цъфтеж
Картофи	Намалява предразположеността към сини и черни петна, жизненост, толерантност към стрес	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	от 6-ти лист
Бобови култури	цъфтеж, добив, засилва образуването на грудките, съдържание на протеин	1 - 2 пъти 0,600 л/дка	от 6-ти лист
Бобови култури	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ), съдържание на протеин	1 - 2 пъти 0,500 - 1 л/дка	от 6-ти лист
Царевица	добив, усвояване на азот, жизненост	0,600 - 1 л/дка	от 4-ти лист

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Царевица	Повече жизненост (напр. при студ), енергийно съдържание, толерантност към стрес	1 - 2 пъти 0,500 - 1 л/дка	от 4-ти лист
Рапица	добив, усвояване на азот, жизненост	1 - 3 пъти 0,600 - 1 л/дка	от 4-ти лист до начало на цъфтеж
Рапица	Жизненост, толерантност към стрес, маслено съдържание, зимостойчивост	2 - 3 пъти 0,500 - 1 л/дка	от 4-ти лист
Слънчоглед	Жизненост, толерантност към стрес, маслено съдържание	1 - 2 пъти 0,500 - 1 л/дка	от 4-ти лист
Захарно цвекло	добив, усвояване на азот, жизненост, образуване на захари	1 - 3 пъти 0,600 - 1 л/дка	от 6-ти лист
Захарно цвекло	Жизненост, толерантност към стрес, образуване на захар	2 - 3 пъти 0,500 - 1 л/дка	от 6-ти лист
Ягоди	Твърдост и големина на плода, образуване на захар, повече жизненост(напр. при студ)	2 - 3 пъти 0,500 л/дка	от завръз на плодове
Семкови плодове	оцветяване, големина на плода	2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка	от юнското окапване на плодовете до беритба
Семкови плодове	Твърдост и големина на плода, образуване на захар, повече жизненост (напр. при студ), червено оцветяване	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	От края на юнското окапване на плодовете
Костилкови плодове	Твърдост и големина на плода, образуване на захар, повече жизненост(напр. при студ)	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	от завръз на плодове

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Храстовидни плодове	Твърдост и големина на плода, образуване на захар, повече жизненост(напр. при студ)	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	от завръз на плодове
Десертно грозде	начално развитие, жизненост	1 - 2 пъти 0,600 л/дка	преди цъфтеж
Десертно грозде	узряване на пръчките, образуване на захари	1 - 2 пъти 0,600 л/дка	от затваряне на чепката до начало на зреене
Десертно грозде	узряване на пръчките, качество, студоустойчивост, образуване на захари	2 - 3 пъти 0,500 л/дка	От големина на грахово зърно
Винено грозде	узряване на пръчките, образуване на захари	1 - 2 пъти 0,600 л/дка	от затваряне на чепката до начало на зреене
Винено грозде	начално развитие, жизненост	1 - 2 пъти 0,600 л/дка	преди цъфтеж
Винено грозде	узряване на пръчките, качество, студоустойчивост, образуване на захари	2 - 3 пъти 0,500 л/дка	От големина на грахово зърно
Зеленчуци	Трайност, качество, повече жизненост(напр. при студ)	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци	добив, дълготрайност, усвояване на азот, качество, жизненост	2 - 4 пъти 0,600 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури	Твърдост и големина на плода, повече жизненост (напр. при студ), зимоустойчивост	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	от завръз на плодове
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	добив, дълготрайност, усвояване на азот, качество, жизненост	2 - 4 пъти 0,600 л/дка	при достатъчно развита листна маса

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	Трайност, качество, повече жизненост(напр. при студ)	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Хмел	Трайност, качество, толерантност към стрес, качество на коренището	2 - 5 пъти 0,500 - 1 л/дка	0,5 м височина до беритба
Тютюн	Трайност, качество на листото, толерантност към стрес	2 - 3 пъти 0,500 - 1 л/дка	от 4-ти лист
Коледни дръвчета	Трайност, качество на игличките, толерантност към стрес, зимоустойчивост	2 - 3 пъти 0,500 - 1 л/дка	при необходимост
Тревни настилки	зелен цвят и качество на листото, фотосинтеза	2 - 4 пъти 0,600 - 1 л/дка	по време на вегетационния период
Тревни настилки	Жизненост, устойчивост на замръзване	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	по време на вегетационния период
Ядки	Твърдост и големина на плода, образуване на захар, повече жизненост(напр. при студ)	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	от завръз на плодове
Памук	Трайност, качество, толерантност към стрес, зимоустойчивост	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Ориз	Усвояване на азот, жизненост, толерантност към стрес	2 - 3 пъти 0,500 - 1 л/дка	от 3-ти лист