



Продуктова информация

Lebosol® - КвадроМаксС СК

СЛОЖЕН ТЕЧЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ,
Суспензия на тор с макроелемент, S (+19)

19,4 % обща сяра (305 гр/л S)

5,1 % обща мед като меден оксихлорид (80 гр/л Cu)

8,0 % общ манган като манганов карбонат (125 гр/л Mn)

6,4 % общ цинк под формата на оксид (100 гр/л Zn)

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	за снабдяване с хранителните елементи манган, мед, цинк и сяра	0,150 - 0,300 л/дка (При литно торене в най-малко 20 литра вода. При апликация с ръчна/гръбна пръскачка 0,2%-ен разтвор.)	при необходимост
При всички култури	хранително снабдяване с: манган, мед и цинк, качество на листото, добив, воден баланс, фотосинтетичен капацитет, намаляне на радиационния стрес (антиоксиданти)	0,150 - 0,300 л/дка (При листно торене в най-малко 20 литра вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,2%-ен разтвор.)	при необходимост
При всички култури	третиране на посевния материал с хранителни вещества за по-добро начално развитие	2 - 4 л/т	към третирането на посевния материал

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Житни култури	добив, усвояване на азот, фотосинтеза, устойчивост при презимуване	0,150 - 0,200 л/дка (препоръка за есенно-житните култури)	през есента от 3-ти лист
Житни култури	братене, добив, усвояване на азот, устойчивост	0,150 - 0,200 л/дка (препоръка за есенно-житните култури)	през пролетта от начало на вегетация
Житни култури	съдържание на протеин и качество на зърното, добив, усвояване на азот	0,150 - 0,200 л/дка (препоръка за есенно-житните култури)	от изкласяване до цъфтеж
Житни култури	братене, добив, усвояване на азот, устойчивост	2 пъти 0,150 - л/дка (препоръка за пролетни житни култури)	от 3-ти лист
Житни култури	добив, усвояване на азот, фотосинтеза, устойчивост при презимуване	1 - 3 пъти 0,150 - 0,300 л/дка	от 3-ти лист
Пасища и ливади	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза, устойчивост при презимуване	2 - 5 пъти 0,150 - 0,200 л/дка	по време на вегетационния период
Пасища и ливади	Усвояване на азот, жизненост, братене, здравина на стъблото, зимоустойчивост	2 - 5 пъти 0,200 л/дка	по време на вегетационния период
Картофи	Усвояване на азот, жизненост, качество на обелката	2 - 4 пъти 0,200 - 0,300 л/дка	от 6-ти лист
Картофи	качество на кората, имунитет	1 - 2 пъти 0,150 - 0,300 л/дка	от началото на оформяне на реда
Бобови култури	фотосинтеза, резистентност, устойчивост при презимуване	1 - 2 пъти 0,150 - 0,200 л/дка	от 6-ти лист
Бобови култури	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ), съдържание на протеин	1 - 2 пъти 0,150 - 0,300 л/дка	от 6-ти лист

Лебозол®България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Царевица	добив, фотосинтеза, имунитет	0,200 л/дка	от 4-ти лист
Царевица	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ)	1 - 2 пъти 0,150 - 0,300 л/дка	от 4-ти лист
Рапица	Усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание, зимоустойчивост	2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка	от 4-ти лист
Рапица	добив, фотосинтеза, имунитет, студоустойчивост	0,150 л/дка	през есента от 4-ти лист
Рапица	добив, фотосинтеза, имунитет, студоустойчивост	1 - 2 пъти 0,150 л/дка	през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
Слънчоглед	добив, фотосинтеза, имунитет	0,150 л/дка	от 4-ти лист
Слънчоглед	Усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание	1 - 2 пъти 0,150 - 0,300 л/дка	от 4-ти лист
Захарно цвекло	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ)	1 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка	от 6-ти лист
Захарно цвекло	добив, фотосинтеза, имунитет	1 - 2 пъти 0,150 л/дка	от 6-ти лист
Ягоди	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ)	2 - 4 пъти 0,200 л/дка	от зелена пъпка
Семкови плодове	Усвояване на азот, жизненост, оцветяване на плода	2 - 4 пъти 0,200 л/дка	От червени пъпки до беритба
Костилкови плодове	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ)	2 - 3 пъти 0,200 л/дка	от завръз на плодове
Храстовидни плодове	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ)	2 - 3 пъти 0,200 л/дка	При започване растежа на леторастите
Десертно грозде	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ)	2 - 3 пъти 0,200 л/дка	видими леторасти
Винено грозде	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ)	2 - 3 пъти 0,200 л/дка	видими леторасти
Зеленчуци	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ)	2 - 4 пъти 0,200 - 0,300 л/дка	при достатъчно развита листна маса

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Зеленчуци	добив, фотосинтеза, качество, имунитет	1 - 2 пъти 0,150 - 0,300 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ)	2 - 3 пъти 0,200 л/дка	От бели пъпки до беритба
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	цвят на листото, качество, устойчивост	1 - 2 пъти 0,150 - 0,300 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	Усвояване на азот, качество на листото, повече жизненост (напр. при студ), маслено съдържание	2 - 4 пъти 0,200 - 0,300 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Хмел	Усвояване на азот, жизненост	2 - 4 пъти 0,200 л/дка	0,5 м височина до беритба
Тютюн	Усвояване на азот, жизненост	1 - 3 пъти 0,200 л/дка	от 4-ти лист
Коледни дръвчета	Усвояване на азот, жизненост, зимоустойчивост	2 - 3 пъти 0,200 л/дка	от разлистване
Декоративни растения	Качество на листото, жизненост	2 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	при необходимост
Тревни настилки	Усвояване на азот, жизненост, братене, здравина на стъблото, зимоустойчивост	2 - 5 пъти 0,200 л/дка	по време на вегетационния период
Ядки	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ), качество на черупката	2 - 5 пъти 0,200 л/дка	От набъбване на пъпки
Памук	Усвояване на азот, повече жизненост(напр. при студ), зимоустойчивост	2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка	от завръз на плодове
Ориз	Усвояване на азот, жизненост, братене, здравина на стъблото	2 - 3 пъти 0,150 - 0,300 л/дка	от 3-ти лист