

Lebosol **Продуктова информация**

MADE IN GERMANY

Lebosol®-Комбифос

Течен неорганичен тор с макроелементи
РК торов разтвор 31-5 (+4.4 Mg), с микроелементи

Хранителни вещества
31,2% общ фосфорен пентаоксид във водоразтворима форма (474 g/l P_2O_5)
5% общ калиев оксид, водоразтворим (76 g/l K_2O)
4,4% магнезиев оксид, водоразтворим (67 g/l MgO)
0,2% обща мед под формата на меден оксид (3 g/l Cu)
1,0% манган водоразтворим, под формата на манганов нитрат (15 g/l Mn)
0,45% общ цинк под формата на цинков оксид (7 g/l Zn)

Допълнително съдържа:
0.5% Общ азот като нитратен азот (8 гр/л N)

Растенията, които не са достатъчно добре снабдени с хранителни вещества, са по-податливи на заболявания.
Листното торене осигурява ефективно и бързо снабдяване на растенията с хранителни вещества.

Култура	Цел/проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	Снабдяване с фосфор, калий и магнезий; стимулиране на ранното развитие (особено при студени и влажни условия); устойчивост на стрес; повишена енергия	150 – 1000 мл/дка (при листно приложение в поне 20 л вода; 1% разтвор при пръскане с гръбна пръскачка. Да не се прилага по време на цъфтеж!)	При необходимост
Зимни/летни житни култури	Стимулиране на ранното развитие (особено при студени и влажни условия); устойчивост на стрес; повишена енергия	1 – 2 приложения по 150 - 500 мл/дка от фаза 3-ти лист	От фаза 3-ти лист

Култура	Цел/проблем	Препоръка	Момент на приложение
Тревни площи	Стимулиране на ранното развитие (пролетта); ефективност на азота	2 – 5 приложения по 200 – 1000 мл/дка	През вегетационния период
Картофи	Залагане на клубени; качество на клубените/ кората; растеж на клубените; калибриране	2 – 4 приложения по 200 – 1000 мл/дка	При образуване на клубените
Бобови култури	Стимулиране на ранното развитие (особено при студени и влажни условия); устойчивост на стрес; повишена енергия	1 – 2 приложения по 200 - 500 мл/дка	От фаза 6-ти лист
Царевица	Стимулиране на ранното развитие (особено при студени и влажни условия); ефективност на азота; жизненост	1 – 2 приложения по 200 - 500 мл/дка	От фаза 4-ти лист
Зимна маслодайна рапица	Стимулиране на ранното развитие (особено при студени и влажни условия); ефективност на азота; жизненост: маслености	1 – 2 приложения по 200 - 1000 мл/дка	От фаза 4-ти лист
Слънчоглед	Стимулиране на ранното развитие (особено при студени и влажни условия); ефективност на азота; жизненост: маслености	1 – 2 приложения по 200 - 500 мл/дка	От фаза 4-ти лист
Ягоди	Жизненост; твърдост на плода; стабилност при съхранение и транспорт	2 – 4 приложения по 200 - 500 мл/дка	От залагане на плода
Семкови плодове	Наситен червен цвят; твърдост на плода; стабилност при съхранение и транспорт	2 приложения 400 - 1000 мл/дка	4 и 2 седмици преди беритба
Костилкови плодове	Жизненост; твърдост на плода; стабилност при съхранение и транспорт	2 – 4 приложения по 400 - 1000 мл/дка	От залагане на плода
Горски плодове	Жизненост; твърдост на плода; стабилност при съхранение и транспорт	2 – 4 приложения по 200 - 500 мл/дка	От залагане на плода
Десертно грозде	Жизненост; твърдост на плода; стабилност при съхранение и транспорт	2 – 4 приложения по 200 - 600 мл/дка	От залагане на плода
Ядки	Жизненост; твърдост на плода; стабилност при съхранение и транспорт	2 – 4 приложения по 200 - 500 мл/дка	От залагане на плода
Винено грозде	Жизненост; твърдост на плода; стабилност при съхранение и транспорт	2 – 4 приложения по 200 - 600 мл/дка	От залагане на плода
Зеленчукови култури	Стимулиране на ранното развитие (особено при студени и влажни условия); ефективност на азота; жизненост; вътрешно качество	2 – 4 приложения по 200 - 1000 мл/дка	При достатъчно развита листна маса

Култура	Цел/проблем	Препоръка	Момент на приложение
Лечебни, ароматни и подправки	Стимулиране на ранното развитие (особено при студени и влажни условия); ефективност на азота; жизненост; вътрешно качество	2 – 4 приложения по 200 - 1000 мл/дка	При достатъчно развита листна маса
Тютюн	Стимулиране на ранното развитие (особено при студени и влажни условия); ефективност на азота; жизненост; вътрешно качество	1 – 2 приложения по 200 - 500 мл/дка	От фаза 4-ти лист
Зеленолистни	Стимулиране на ранното развитие (особено при студени и влажни условия); ефективност на азота; жизненост; вътрешно качество	2 – 5 приложения по 200 - 1000 мл/дка	По време на цялата вегетация
Памук	Стимулиране на ранното развитие; ефективност на азота; стабилност на влакното	2 – 4 приложения по 200 - 500 мл/дка	От фаза 4-ти лист
Ориз	Стимулиране на ранното развитие; устойчивост на стрес; повишена енергия	1 – 2 приложения по 200 - 500 мл/дка	От фаза 3-ти лист