



MADE IN
GERMANY

ХептаЖелязо

Неорганичен еднокомпонентен тор с микроелементи
Торов разтвор с микроелементи

5% желязо, водоразтворимо, като комплекс на хепта-глюконова киселина (66 г/л Fe)

Растенията, които са недостатъчно снабдени с хранителни вещества, са повече предразположени към болести. Листното торене осигурява ефективно и бързо снабдяване с хранителни вещества

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	За снабдяване с желязо, качество на листото, добив, воден баланс, фотосинтеза, намаляване на топлинния стрес	0,3 – 0,7 л/дка (листно. Мин. 30 л вода. При приложение с ръчна пръскачка 1 %-ен. Ранните приложения са по-ефективни!)	При необходимост
При всички култури	За снабдяване с желязо, качество на листото, добив, воден баланс, фотосинтеза, намаляване на стреса	Фертигация	Попитайте Вашия професионален консултант!
Царевица	Предотвратяване/преодоляване на желязна хлороза	1 – 3 пъти 0,3 – 0,7 л/дка	От 4-ти лист
Ягоди	Предотвратяване/преодоляване на желязна хлороза	0,3 – 0,4 л почвено/лентово третиране(на 100 м ред)	През февруари/март
Ягоди	Предотвратяване/преодоляване на желязна хлороза	2 – 6 пъти 0,3 – 0,7 л/дка (през листото)	От зелена пъпка
Семкови	Предотвратяване/преодоляване на желязна хлороза	2 – 4 пъти 0,3 – 0,7 л/дка (през листото)	Червена пъпка



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Семкови	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	30 – 60 мл/дърво (през почвата, чрез поливане)	През февруари/март
Костилкови	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	30–60 мл/дърво (през почвата, чрез поливане)	През февруари/март
Костилкови	Предотвратяване/преодолява- не на желязна хлороза	2 – 4 пъти 0,3 – 0,7 л/дка (през листото)	От завръз
Храстовидни	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	0,3 – 0,4 л (почвено/ лентово третиране на 100 м ред)	През февруари/март
Храстовидни	Предотвратяване/преодолява- не на желязна хлороза	2 – 4 пъти 0,3 – 0,7 л/дка (през листото)	Развитие на летораст
Десертно грозде	Предотвратяване/преодолява- не на желязна хлороза	2 – 6 пъти 0,3 – 0,7 л/дка	От разлистване до беритба
Десертно грозде	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	15 – 25 мл (с 1 л вода) (през почвата /лентово третиране на пръчка)	През февруари/март
Цитруси	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	40 – 80 мл/дърво (през почвата, чрез поливане)	През февруари/март
Цитруси	Предотвратяване/преодолява- не на желязна хлороза	2 – 6 пъти 0,3 – 0,7 л/дка	От бяла пъпка
Орехи	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	30 – 60 мл/дърво (през почвата, чрез поливане)	През февруари/март
Орехи	Предотвратяване/преодолява- не на желязна хлороза	2 – 4 пъти 0,3 – 0,7 л/дка (през листото)	От завръз
Винено грозде	Предотвратяване/преодолява- не на желязна хлороза	2 – 6 пъти 0,3 – 0,7 л/дка	От разлистване до беритба
Винено грозде	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	15 – 25 мл (с 1 л вода) (през почвата /лентово на пръчка)	През февруари/март
Зеленчуци общо	Предотвратяване/преодолява- не на желязна хлороза	2 – 4 пъти 0,3 – 0,7 л/дка (през листото)	При достатъчно развита листна маса
Декоративни	Предотвратяване/ преодоляване на желязна хлороза	5 – 10 мл (почвено, с 1 л вода/м ² или при фертигация макс. 500 мл в 1000 л вода)	При необходимост
Декоративни	Предотвратяване/преодолява- не на желязна хлороза	0,3 – 0,7 л/дка (листно)	При необходимост

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Тревни настилки	Предотвратяване/преодоляване на желязна хлороза	50 – 70 мл/100м ² (почвено, в мин. 4 л вода)	По време на вегетация
Тревни настилки	Предотвратяване/преодоляване на желязна хлороза	2 – 6 пъти 0,3 – 0,7 л/дка (листно, в мин. 400 л вода)	По време на вегетация
Памук	Предотвратяване/преодоляване на желязна хлороза	2 – 4 пъти 0,3 – 0,7 л/дка	При необходимост
Ориз	Предотвратяване/преодоляване на желязна хлороза	1 – 3 пъти 0,3 – 0,7 л/дка	От 3-ти лист