



Продуктова информация



Lebosol® - МагС СК

СЛОЖЕН ТЕЧЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ
Mg-S-тор (+24, +16) в суспензия

24,1 % общ магнезиев оксид (350 гр/л MgO)
16,6 % обща сяра (240 гр/л S)

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	за снабдяване с магнезий и сяра	0,300 - 0,500 л/дка (При листно торене в най-малко 20 л вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,5 %-ен разтвор.)	при необходимост
При всички култури	за снабдяване с магнезий и сяра, транспортиране на фосфор, добив, издръжливост, усвояване на азот, качество на листото, фотосинтетичен капацитет	0,300 - 0,500 л/дка (При листно торене в най-малко 20 л вода. При пръскане с гръбна/ръчна пръскачка с 0,5 %-ен р-р.)	при необходимост
Житни култури	съдържание на протеин и качество на зърното, добив, усвояване на азот	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от изкласяване

Лебозол® България ООД
ул. Метро 5 • 5800 Плевен
телефон: 064 988 041
info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Житни култури	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	през пролетта от начало на вегетация до изкласяване
Житни култури	качество на зърното, съдържание на протеин, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес, зимостойчивост	1 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 3-ти лист
Пасища и ливади	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	по време на вегетационния период
Пасища и ливади	усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес, енергийно съдържание, зимостойчивост	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	по време на вегетационния период
Картофи	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от началото на оформяне на реда
Картофи	усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес, качество на обелката	1 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Бобови култури	съдържание на протеин, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Бобови култури	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Царевица	качество на зърното, енергийно съдържание, подсилване на толерантността към стрес	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Царевица	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 4-ти лист

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Рапица	добив, маслено съдържание, качество на листото, фотосинтеза	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
Рапица	усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес, маслено съдържание, зимостойчивост	1 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Слънчоглед	усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес, маслено съдържание	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Слънчоглед	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Захарно цвекло	усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	1 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Захарно цвекло	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	1 - 2 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Ягоди	усвояване за азот, жизненост, качество на листата	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от зелена пъпка
Ягоди	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	начало на цъфтеж до беритба
Семкови плодове	качество на листото, усвояване на азот, жизненост, срещу преждевременно окапване на листата	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	червени пъпки
Семкови плодове	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	след прецъфтяване (при склонни към ръжда сортове, едва от големина на орех)

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Костилкови плодове	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	завръз на плодове до беритба
Костилкови плодове	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от завръз на плодове
Храстовидни плодове	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	начало на цъфтеж до беритба
Храстовидни плодове	срещу преждевременно окапване на листата, качество на листата, фотосинтеза, жизненост	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	при започване растежа на леторастите
Десертно грозде	качество на листото, фотосинтеза, предотвратяване на кафяво гниене	2 - 5 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	след цъфтеж до затваряне на чепката
Десертно грозде	качество на листото, усвояване на азот, жизненост, предотвратяване парализа на стъблото	2 - 5 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от нарастване на леторастите
Винено грозде	качество на листото, усвояване на азот, жизненост, предотвратяване парализа на стъблото	2 - 5 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от нарастване на леторастите
Винено грозде	зеленина и качество на листото, фотосинтеза, срещу кафяво гниене	2 - 5 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	след цъфтеж до затваряне на чепката
Зеленчуци	качество на листото, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес, вътрешно качество	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	при достатъчно развита листна маса

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Зеленчуци	качество на листото, жизненост, фотосинтеза	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури	усвояване за азот, жизненост, качество на листата	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от бели пъпки
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	зелинина и качество на листото, добив, фотосинтеза	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	качество на листото, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес, вътрешно качество	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Хмел	зелинина и качество на листото, добив, фотосинтеза	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Хмел	качество на листото, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	0,5 м височина до беритба
Тютюн	качество на листото, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	1-3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Тютюн	качество на листото, добив, фотосинтеза, жизненост	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Коледни дръвчета	качество на листото, усвояване на азот, жизненост, срещу преждевременно окапване на игличките	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от разлистване
Коледни дръвчета	срещу преждевременно окапване на игличките, повече жизненост, качество на игличките, фотосинтеза	2 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	по време на вегетационния период

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Декоративни растения	качество на листото, жизненост, фотосинтеза	2 - 3 пъти 0,100 л (на 10 литра вода за пръскане, 0,300 - 0,500 л/дка)	при необходимост
Декоративни растения	качество на листото, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	2 - 3 пъти 1л (на 100 л. вода, 0,350 л/дка)	при необходимост
Тревни настилки	качество на листото, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес, зимостойчивост	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	по време на вегетационния период
Тревни настилки	качество на листото, жизненост, фотосинтеза	1 - 5 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	по време на вегетационния период
Ядки	усвояване за азот, жизненост, качество на листата	2 - 4 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от завръз на плодове
Памук	качество на листото, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	1 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от разлистване
Ориз	качество на зърното, усвояване на азот, подсилване на толерантността към стрес	1 - 3 пъти 0,300 - 0,500 л/дка	от 3-ти лист