



Продуктова информация



Lebosol® - Магфос

СЛОЖЕН ТЕЧЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ
NP (Mg) тор 3-30 (+7), в разтвор

3 % общ азот като амиден азот (45 гр/л N)

30 % общ фосфорен пентоксид във водоразтворима форма (450 гр/л P_2O_5)

6,8 % магнезиев оксид, водоразтворим (100 гр/л MgO)

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	За снабдяване с фосфор и магнезий, транспортиране на фосфор, добив, повече жизненост (напр. при студ), усвояване на азот, енергиен баланс, фотосинтетичен капацитет, образуване на корени	0,500 - 1 л/дка (При листно торене в най-малко 200л. вода. При пръскане с гръбна/ръчка пръскачка- 1%-ен р-р. Не по време на цъфтежа)	при необходимост
При всички култури	снабдяване с фосфор	0,500 - 1 л/дка (При листно торене в най-малко 20 л вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 1 %-ен разтвор)	при необходимост
Житни култури	енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост, студоустойчивост	0,500 л/дка (предимно при студ и влага)	през есента от 3-ти лист

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Житни култури	енергиен баланс, добив, усвояване на азот, жизненост	2 пъти 0,500 л/дка	през пролетта от начало на вегетация до изкласяване
Житни култури	Качество на зърното, съдържание на протеин, зимостойчивост	1-2 пъти 0,500 л/дка	от 3-ти лист
Пасища и ливади	енергиен баланс, добив, усвояване на азот, жизненост	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	по време на вегетационния период
Пасища и ливади	Засилване началното развитие (през пролетта), усвояване на азот, зимостойчивост	2 - 5 пъти 0,500 - 1 л/дка	по време на вегетационния период
Картофи	Залагане на грудки, качество на грудките и обелката, нарастване на грудките, сортиране	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	при удебеляване на столоните
Картофи	добив, залагане на грудки, качество и размер на грудките	2 пъти 0,6 л/дка	при удебеляване на столоните
Картофи	добив, качество на грудките и обвивката, нарастване на грудките	2 пъти 0,600 л/дка	от 10 мм диаметър на грудката
Бобови култури	образуване на грудки, качество, зрялост	2 пъти 0,600 л/дка	от 6-ти лист
Бобови култури	Образуване на грудки, качество, съдържание на протеин	1 - 2 пъти 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Царевица	начално развитие, енергиен баланс, добив, усвояване на азот, жизненост	1 - 2 пъти 0,500 л/дка (предимно при студ и влага)	от 4-ти лист
Царевица	Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост	1 - 2 пъти 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Рапица	Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание	1 - 2 пъти 0,500 - 1 л/дка	от 4-ти лист

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Рапица	енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост	1 - 2 пъти 0,500 л/дка (предимно при студ и влага)	през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
Слънчоглед	начално развитие, енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост	0,500 л/дка (предимно при студ и влага)	от 4-ти лист
Слънчоглед	Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание	1 - 2 пъти 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Захарно цвекло	развитие на листото, начално развитие, усвояване на азот, растеж на корените, образуване на захари	1 - 2 пъти 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Захарно цвекло	Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, образуване на захар	1 - 3 пъти 0,500 л/дка	от 6-ти лист
Ягоди	Жизненост, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	от завръз на плодове
Семкови плодове	Червени покривни цветове, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 пъти 1 л/дка	4 и 2 седмици преди беритба
Костилкови плодове	Жизненост, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 4 пъти 0,500 -1 л/дка	от завръз на плодове
Храстовидни плодове	Жизненост, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	от завръз на плодове
Десертно грозде	Жизненост, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 4 пъти 0,500 -1 л/дка	от завръз на плодове

Лебозол®България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Винено грозде	Жизненост, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	от завръз на плодове
Аспержи	енергиен баланс, добив, усвояване на азот, натрупване на хранителни резерви, жизненост	1 - 3 пъти 0,500 - 1 л/дка	от средата на вегетационния период
Зеленчуци	Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, вътрешно качество	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци	енергиен баланс, добив, усвояване на азот, качество	1 - 3 пъти 0,600 л/дка (предимно при студ и влага)	при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури	Жизненост, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	от завръз на плодове
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, вътрешно качество	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	енергиен баланс, добив, усвояване на азот, качество	1 - 3 пъти 0,600 л/дка (предимно при студ и влага)	при достатъчно развита листна маса
Хмел	Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, вътрешно качество	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	0,5 м височина до беритба
Тютюн	Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, вътрешно качество	1 - 2 пъти 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Коледни дръвчета	Усвояване на азот, жизненост	1 - 3 пъти 0,500 - 1 л/дка	от разлистване



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Тревни настилки	начално развитие, жизненост, коренообразуване	3 - 5 пъти 0,500 - 0,800 л/дка (предимно при студ и влага)	по време на вегетационния период
Тревни настилки	Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост	2 - 5 пъти 0,500- 1 л/дка	по време на вегетационния период
Ядки	Жизненост, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	от завръз на плодове
Памук	Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, стабилност на влакната	2 - 4 пъти 0,500 л/дка	от 4-ти лист
Ориз	Качество на зърното, съдържание на протеин, усвояване на азот	1 - 2 пъти 0,500 л/дка	от 3-ти лист

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition

