



Продуктова информация



Lebosol® - МангАмино

ЕДНОКОМПОНЕНТЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ

Разтвор на тор с микроелемент

11,4 % манган под формата на сулфат, водоразтворим (160 гр/л Mn)

Допълнително се съдържат: 6,7 % сяра (95 гр/л S)

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	за снабдяване с манган	0,100 - 0,300 л/дка (При листно торене в най-малко 20 л вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,5 - 1%тен разтвор. Многократната употреба с пониски разходни норми повишава ефективността.)	при необходимост
Житни култури	добив, усвояване на азот, фотосинтеза, устойчивост при презимуване	0,200 - 0,300 л/дка (препоръка за есенно-житни култури)	през есента от 3-ти лист
Житни култури	братене, добив, усвояване на азот, устойчивост	0,200 - 0,300 л/дка (препоръка за есенно-житни култури)	през пролетта от начало на вегетация

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Житни култури	братене, добив, усвояване на азот, устойчивост	2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка (препоръка за пролетни житни култури)	от 3-ти лист
Пасища и ливади	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза, устойчивост при презимуване	2 - 5 пъти 0,200 - 0,300 л/дка	през пролетта от начало на вегетация
Картофи	качество на кората, имунитет	1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка	от началото на оформяне на реда
Бобови култури	добив, фотосинтеза, имунитет, студоустойчивост	1 - 2 пъти 0,200 л/дка	от 6-ти лист
Царевица	добив, фотосинтеза, имунитет	0,200 - 0,300 л/дка	от 4-ти лист
Рапица	добив, фотосинтеза, имунитет, студоустойчивост	0,200 л/дка	през есента от 4-ти лист
Рапица	добив, фотосинтеза, имунитет, студоустойчивост	1 - 2 пъти 0,200 л/дка	през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
Слънчоглед	добив, фотосинтеза, имунитет	1 - 2 пъти 0,200 л/дка	от 4-ти лист
Захарно цвекло	добив, фотосинтеза, имунитет	1 - 2 пъти 0,200 л/дка	от 6-ти лист
Ягоди	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	2 - 4 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	през пролетта от начало на вегетация
Семкови плодове	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	2 - 4 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	след прецъфтяване (при склонни към ръжда сортове, едва от големина на орех)
Семкови плодове	зелен основен цвят	2 - 4 пъти 0,200 л/дка	от юнското окапване на плодовете до беритба
Костилкови плодове	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	2 - 3 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	от завръз на плодове до беритба
Храстовидни плодове	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	2 - 4 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	от начало на развитие на летораста до беритба

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Десертно грозде	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	2 - 4 пъти 0,200 л/ дка	видими леторасти
Винено грозде	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	2 - 4 пъти 0,200 л/ дка	видими леторасти
Зеленчуци	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	2 - 3 пъти 0,100 - 0,300 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	2 - 3 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Хмел	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	2 - 4 пъти 0,200 - 0,300 л/дка	от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Тютюн	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	1 - 3 пъти 0,200 л/дка	от 4-ти лист
Коледни дръвчета	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	2 - 4 пъти 0,200 л/ дка	по време на вегетационния период
Декоративни растения	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	2 - 3 пъти 0,100 - 0,200 л/дка (0,500 л/ дка на 10 литра вода за пръскане)	при необходимост
Тревни настилки	братене, качество на листото, фотосинтеза, устойчивост	1 - 5 пъти 0,200 л/дка	по време на вегетационния период