



Продуктова информация



Lebosol® - Манган-Нитрат 235

ЕДНОКОМПОНЕНТЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ

Разтвор на тор с микроелемент

15 % манган под формата на нитрат, водоразтворим (235 гр/л Mn)

Допълнително се съдържат: 7,7 % общ азот като нитратен азот (120 гр/л N)

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	за снабдяване с манган	0,100 - 0,200 л/дка (При листно торене в най-малко 20 л вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,25 - 0,5%-ен разтвор. Многократната употреба с малки дози повишава ефективността.)	при необходимост
При всички култури	За снабдяване с Манган, качество на листото, воден баланс, фотосинтетичен капацитет, редуциране на радиационния стрес (Антиоксиданти)	Повече приложение с 0,100 - 0,200 л/дка (В най-малко 20 л. вода. При пръскане с ръчна пръскачка в 0,25%-ен разтвор. Не по време на цъфтеж.)	при необходимост

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Житни култури	добив, усвояване на азот, фотосинтеза, устойчивост при презимуване	0,100 - 0,200 л/дка (препоръка за есенно-житни култури)	през есента от 3-ти лист
Житни култури	братене, добив, усвояване на азот, устойчивост	0,100 - 0,200 л/дка (препоръка за есенно-житни култури)	през пролетта от начало на вегетация
Житни култури	братене, добив, усвояване на азот, устойчивост	2 пъти 0,050 - 0,100 л/дка (препоръка за пролетни житни култури)	от 3-ти лист
Житни култури	Усвояване на азот, жизненост, братене, здравина на стъблото, зимоустойчивост	2 - 4 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	от 3-ти лист
Пасища и ливади	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза, устойчивост при презимуване	2 - 5 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	по време на вегетационния период
Пасища и ливади	Усвояване на азот, жизненост, братене, здравина на стъблото, зимоустойчивост	2 - 5 пъти 0,100 л/дка	по време на вегетационния период
Картофи	Усвояване на азот, жизненост, бързо начално развитие, качество на обелката	0,100 л/дка	към третирането на посевния материал
Картофи	Усвояване на азот, жизненост, качество на обелката	2 - 4 пъти 0,200 л/дка	от 6-ти лист
Картофи	намалява предразположеността към струпясване	0,100 л/дка	към третирането на посевния материал
Картофи	качество на кората, имунитет	1 - 2 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	от началото на оформяне на реда
Бобови култури	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ), съдържание на протеин	1 - 3 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	от 6-ти лист
Бобови култури	добив, фотосинтеза, имунитет, студоустойчивост	1 - 2 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	от 6-ти лист

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Царевица	добив, фотосинтеза, имунитет	0,100 - 0,200 л/дка	от 4-ти лист
Царевица	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ)	1 - 2 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	от 4-ти лист
Рапица	добив, фотосинтеза, имунитет, студоустойчивост	0,100 - 0,200 л/дка (1 - 2 пъти 0,100 - 0,200 л/дка през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж)	през есента от 4-ти лист
Рапица	Усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание, зимоустойчивост	2 - 3 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	от 4-ти лист
Слънчоглед	добив, фотосинтеза, имунитет	0,100 - 0,200 л/дка	от 4-ти лист
Слънчоглед	Усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание	1 - 2 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	от 4-ти лист
Захарно цвекло	добив, фотосинтеза, имунитет	1 - 2 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	от 6-ти лист
Захарно цвекло	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ)	1 - 3 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	от 6-ти лист
Ягоди	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	2 - 4 пъти 0,100 л/дка	през пролетта от начало на вегетация
Ягоди	Усвояване на азот, жизненост, зимоустойчивост	2 - 4 пъти 0,100 л/дка	от зелена пъпка
Семкови плодове	зелен основен цвят	2 - 4 пъти 0,100 л/дка	от юнското окапване на плодовете до беритба
Семкови плодове	Усвояване на азот, жизненост, оцветяване на плода	2 - 4 пъти 0,100 л / дка	Червени пъпки
Семкови плодове	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	2 - 4 пъти 0,100 л/дка	след прецъфтяване (при склонни към ръжда сортове, едва от големина на орех)

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Костилкови плодове	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ)	2 - 3 пъти 0,100 л/дка	от завръз на плодове
Костилкови плодове	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	2 - 3 пъти 0,100 л/дка	завръз на плодове до беритба
Храстовидни плодове	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	2 - 4 пъти 0,100 л/дка	от начало на развитие на леторастите до беритба
Храстовидни плодове	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ)	2 - 3 пъти 0,100 л/дка	При започване растежа на леторастите
Десертно грозде	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	2 - 4 пъти 0,100 л/дка	видими леторастите
Десертно грозде	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ)	2 - 3 пъти 0,100 л/дка	видими леторастите
Винено грозде	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	2 - 4 пъти 0,100 л/дка	видими леторастите
Винено грозде	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ)	2 - 3 пъти 0,100 л/дка	видими леторастите
Зеленчуци	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	2 - 3 пъти 0,100 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ)	2 - 4 пъти 0,100 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	Усвояване на азот, качество на листото, повече жизненост (напр. при студ), маслено съдържание	2 - 4 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Хмел	Усвояване на азот, жизненост, зимоустойчивост	1 - 4 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	0,5 м височина до беритба
Хмел	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	2 - 4 пъти 0,100 л/дка	от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Тютюн	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	1 - 3 пъти 0,100 л/дка	от 4-ти лист

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Тютюн	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ)	1 - 3 пъти 0,100 л/дка	от 4-ти лист
Коледни дръвчета	качество на листото, усвояване на азот, фотосинтеза	2 - 3 пъти 0,100 л/дка	от разлистване
Коледни дръвчета	Усвояване на азот, качество на игличките, жизненост, зимостойчивост	2 - 3 пъти 0,100 л/дка	от разлистване
Декоративни растения	Качество на листото, жизненост	2 пъти 0,100 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Тревни настилки	Усвояване на азот, жизненост, братене, здравина на стъблото, зимостойчивост	2 - 5 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	по време на вегетационния период
Тревни настилки	братене, качество на листото, фотосинтеза, устойчивост	1 - 5 пъти 0,100 л/дка	по време на вегетационния период
Ядки	Усвояване на азот, повече жизненост (напр. при студ), качество на черупката	2 - 5 пъти 0,200 л/дка	от завръз на плодове
Памук	Усвояване на азот, повече жизненост(напр. при студ), зимостойчивост	2 - 3 пъти 0,100 л/дка	от 4-ти лист
Ориз	Усвояване на азот, жизненост, братене, здравина на стъблото	1 - 3 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	от 3-ти лист