



BIO

MADE IN GERMANY

**Lebosol**

Продуктова информация

# Lebosol® - Молибден

ЕДНОКОМПОНЕНТЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ

Разтвор на тор с микроелемент

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	за снабдяване с молибден	0,025 л/дка (При листно торене в най-малко 20 л. вода. При ръчно пръскане с 0,1 %-ен разтвор)	при необходимост
При всички култури	За снабдяване с молибден, усвояване на азот, добив, фотосинтетичен капацитет	Капково	Попитайте вашия специалист-консултант!
При всички култури	За снабдяване с молибден, усвояване на азот, добив, фотосинтетичен капацитет	0,025 л /дка (при листно торене в най-малко 20 л. вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка - 0,1% ен р-р)	при необходимост
Пасища и ливади	добив, подобро образувание на грудки, усвояване на азот, жизненост	2 - 3 пъти 0,025 л/ дка	по време на вегетационния период

**Лебозол® България ООД**

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Пасища и ливади	Подобрено образуване на грудки, усвояване на азот, жизненост	2 - 3 пъти 0,025 л/дка	по време на вегетационния период
Бобови култури	Подобрено образуване на грудки, усвояване на азот, жизненост	1 - 2 пъти 0,025 л/дка	от 6-ти лист
Бобови култури	добив, подобро образуване на грудки, усвояване на азот, жизненост	1 - 2 пъти 0,025 л/дка	от 6-ти лист
Рапица	Срещу симптом „Камшична дръжка „Whiptail“-симптом, жизненост, усвояване на азот	1 - 2 пъти 0,025 л/дка	от 4-ти лист
Рапица	добив, срещу Whip-tail-синдром, жизненост	0,025 л/дка	през есента от 4-ти лист
Рапица	добив, срещу „Whiptail“ - синдром, жизненост	2 пъти 0,025 л/дка	през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
Слънчоглед	Усвояване на азот, жизненост	1 - 2 пъти 0,025 л/дка	от 4-ти лист
Захарно цвекло	Срещу затваряне на сърцевината, симптом „Камшична дръжка“, „Whiptail“ -симптом, жизненост, усвояване на азот	1 - 2 пъти 0,025 л/дка	от 6-ти лист
Захарно цвекло	добив, срещу симптоми на зелева галица и „Whiptail“ - синдром, жизненост	0,025 л/дка	от 6-ти лист
Плодни зеленчуци	добив, подобро образуване на грудки, усвояване на азот, жизненост	1 - 2 пъти 0,025 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Зелеви, листни и лукови зеленчуци	добив, подобро образуване на грудки, срещу зелева галица, усвояване на азот, срещу „Whiptail“ - симптом, жизненост	1 - 2 пъти 0,025 л/дка	при достатъчно развита листна маса

#### Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Кореноплодни и клубеноплодни зеленчуци	добив, подобро образуване на грудки, срещу зелена галица, усвояване на азот, срещу Whiptail-симптом, жизненост	1 - 2 пъти 0,025 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци	добив, подобро образуване на грудки, усвояване на азот, жизненост	1 - 2 пъти 0,025 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури	Усвояване на азот, жизненост, качество на листото (жълти петна)	1 - 4 пъти 0,025 л/дка	от бели пъпки
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	добив, подобро образуване на грудки, усвояване на азот, жизненост	1 - 2 пъти 0,025 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	добив, подобро образуване на грудки, усвояване на азот, жизненост	1 - 2 пъти 0,025 л/дка	при достатъчно развита листна маса

