



Продуктова информация



Lebosol® - ПК-Макс

СЛОЖЕН ТЕЧЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ
ПК тор 24-27 в разтвор

23,8 % общ фосфорен пентоксид във водоразтворима форма (385 гр/л P_2O_5)
27,4 % водоразтворим калиев оксид (440 гр/л K_2O)

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	за снабдяване с фосфор и калий, добив, повече жизненост (напр. при студ), усвояване на азот, енергиен и воден баланс, фотосинтетичен капацитет, образуване на корени	0,500 - 1 л/дка (В най-малко 20 л вода. 0,5 - 1%-ен р-р при нормални култури. 0,25 - 0,5%-ен р-р при чувствителни култури под стъкло/фолио)	при необходимост
При всички култури	снабдяване с фосфор и калий	0,500 - 1 л/дка (В най-малко 20 л вода, съответства на 0,5 - 1%-ен разтвор (при чувствителни култури и под стъкло/фолио 0,25 - 0,5 %-ен разтвор)	при необходимост

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	за снабдяване с фосфор и калий, добив, повече жизненост (напр. при студ), усвояване на азот, енергиен и воден баланс, фотосинтетичен капацитет, образуване на корени	Капково	Попитайте вашия специалист-консултант!
Житни култури	енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост, студоустойчивост	0,600 л/дка (предимно при студ и влага)	през есента от 3-ти лист
Житни култури	енергиен баланс, добив, усвояване на азот, жизненост	2 пъти 0,600 л/дка (предимно при студ и влага)	през пролетта от начало на вегетация
Житни култури	Качество на зърното, съдържание на протеин, зимоустойчивост	1 - 2 пъти 0,600 л/дка	от 3-ти лист
Пасища и ливади	енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	по време на вегетационния период
Пасища и ливади	Засилване началното развитие (през пролетта), усвояване на азот, зимоустойчивост	2 - 5 пъти 0,500 - 1 л/дка	по време на вегетация
Картофи	Залагане на грудки, качество на грудките и обелката, нарастване на грудките, сортиране	2 - 4 пъти 0,600 - 1л/дка	при удебеляване на столоните
Картофи	добив, залагане на грудки, качество и размер на грудките	2 пъти 0,600 л/дка	при удебеляване на столоните
Картофи	добив, качество на грудките и обвивката, нарастване на грудките	2 пъти 0,600 л/дка	от 10 мм диаметър на грудката
Бобови култури	образуване на грудки, качество, зрялост	2 пъти 0,600 л/дка	от 6-ти лист
Бобови култури	Образуване на грудки, качество, съдържание на протеин	1 - 2 пъти 0,600 л/дка	от 6-ти лист

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Царевица	начално развитие, енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост	0,600 л/дка (предимно при студ и влага)	от 4-ти лист
Царевица	Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост	1 - 2 пъти 0,600 л/дка	от 4-ти лист
Рапица	Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание	1 - 2 пъти 0,500 - 1 л/дка	от 4-ти лист
Рапица	енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост	1 - 2 пъти 0,600 л/дка (предимно при студ и влага)	през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
Слънчоглед	Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, маслено съдържание	1 - 2 пъти 0,600 л/дка	от 4-ти лист
Слънчоглед	начално развитие, енергиен баланс, усвояване на азот, жизненост	0,600 л/дка (предимно при студ и влага)	от 4-ти лист
Захарно цвекло	Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, образуване на захар	1 - 3 пъти 0,600 л/дка	от 6-ти лист
Захарно цвекло	развитие на листото, начално развитие, усвояване на азот, растеж на корените, образуване на захари	2 пъти 0,600 л/дка	от 6-ти лист
Ягоди	Жизненост, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка	от завръз на плодове
Ягоди	начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост	2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка	начало на вегетация
Ягоди	твърдост на плода, големина на плода	1 - 3 пъти 0,600 - 0,800 л/дка	завръз на плодове до беритба

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Семкови плодове	Червени покривни цветове, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка	4 и 2 седмици преди беритба
Семкови плодове	червен основен цвят, твърдост на плода, големина на плода	2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка	от юнското окапване на плодовете до беритба
Костилкови плодове	Червени покривни цветове, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка	от завръз на плодове
Костилкови плодове	твърдост на плода, големина на плода, захарно съдържание	2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка	завръз на плодове до беритба
Храстовидни плодове	начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост	2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка	начало на вегетация
Храстовидни плодове	твърдост на плода, големина на плода	1 - 3 пъти 0,6 - 0,8 л/дка	завръз на плодове до беритба
Храстовидни плодове	Червени покривни цветове, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка	от завръз на плодове
Десертно грозде	начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост	2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка	от 5-ти лист до начало на цъфтеж
Десертно грозде	Жизненост, здравина на обелката, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка	от завръз на плодове
Винено грозде	начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост	2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка	от 5-ти лист до начало на цъфтеж
Винено грозде	Жизненост, здравина на обелката, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка	от завръз на плодове

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Аспержи	енергиен баланс, добив, усвояване на азот, натрупване на хранителни резерви, жизненост	1 - 3 пъти 0,600 - 1 л/дка	от средата на вегетационния период
Зеленчуци	засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, вътрешно качество, качество на листото	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци	начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост	1 - 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка (предимно при студ и влага)	при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури	Червени покривни цветове, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка	от завръз на плодове
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, вътрешно качество, качество на листото	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост	1 - 2 пъти 0,600 - 0,800 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Хмел	енергиен баланс, добив, усвояване на азот, качество, жизненост	2 - 5 пъти 0,6 - 0,8 л/дка	от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Хмел	Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, вътрешно качество	2 - 4 пъти 0,500 - 1 л/дка	0,5 м височина до беритба
Тютюн	начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост	2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка	от 4-ти лист

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Тютюн	Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост, вътрешно качество	1 - 2 пъти 0,600 л/дка	от 4-ти лист
Коледни дръвчета	начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, жизненост	1 - 3 пъти 0,600 - 0,800 л/дка	от разлистване
Коледни дръвчета	Усвояване на азот, жизненост	1 - 3 пъти 0,500 - 1 л/дка	от разлистване
Декоративни растения	засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, качество на листото	1 - 3 пъти 0,500 л/дка	при необходимост
Тревни настилки	начално развитие, жизненост, коренообразуване	1 - 5 пъти 0,600 - 0,800 л/дка	по време на вегетационния период
Тревни настилки	Засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, жизненост	2 - 5 пъти 0,500 - 1 л/дка	по време на вегетационния период
Ядки	Червени покривни цветове, твърдост на плода, трайност при съхранение и стабилност при транспортиране	2 - 4 пъти 0,600 - 0,800 л/дка	от завръз на плодове
Памук	засилване на началното развитие (особено при студ и влага), усвояване на азот, стабилност на влакната, зимоустойчивост	2 - 4 пъти 0,600 л/дка	от 4-ти лист
Ориз	Качество на зърното, съдържание на протеин, усвояване на азот	1 - 2 пъти 0,600 л/дка	от 3-ти лист