

Нашите препоръки за оптимално снабдяване с хранителни вещества при костилкови:

За какво?	Какво?	Кога?						
		Пъпкуване	Видими съцветия	Масов цъфтеж	Край на цъфтеж	Нарастване на плода	Беритбена зрялост	След беритба
✓ Завръз и големина на плода ✓ Устойчивост на болести ✓ Срещу симптоми на шарка	Аминозол® 			3 пъти 500 – 750 мл/дка				2 пъти 200 мл/дка
✓ Повече жизненост (напр. мраз по време на цъфтеж)	Аминозол® + Лебозол®-Робустус СК + Лебозол®-Калий 450		1 – 2 пъти 200 мл + 200мл + 500 мл/дка					
✓ Воден транспорт (по-малко стрес от горещини) ✓ Преодоляване на желязна хлороза	Лебозол®-Желязо Цитрат ГОЛД				2 – 4 пъти 300 – 700 мл/дка през листото			
		30 – 60 мл/дърво или 300 – 400 мл на 100 м ред (почвено, чрез поливане)						
✓ Качество на плода ✓ Устойчивост на напукване ✓ Добро складиране и транспорт	Лебозол®-Силиций + Фитоамин®			2 – 4 пъти 100 мл/дка + 500 мл/дка				
✓ По-добър фотосинтез ✓ Качество на листото ✓ Жизненост	Лебозол®-Магнезий 400 СК 		2 – 3 пъти 300 – 500 мл/дка					
✓ Качествен цъфтеж ✓ Завръз на плодове ✓ Транспорт на калций	Лебозол®-Цинк 700 СК + Лебозол®-Робустус СК 		2 – 3 пъти 50 – 100 мл/дка + 200 мл/дка					1 – 2 х 50 – 100 мл + 200 мл
✓ Здравина на плода ✓ Добро складиране и транспорт	Лебозол®-Калций-Форте СК				2 – 5 пъти 400 – 800 мл/дка			
✓ По-малко стрес от слънчево лъчение (антиоксидант) ✓ Качество на листото ✓ Воден баланс	Лебозол®-Манган 500 СК 				2 – 3 пъти 50 мл/дка			

Топ 3 на най-предпочитаните Лебозол®-продукти при костилкови:



Лебозол®-Цинк 700 СК

Торова суспензия за снабдяване с цинк
Съдържание: 700 г/л Zn



Лебозол®-Силиций

Торов разтвор с микроелементи за целенасочено укрепване на растителните клетки
Съдържание: 7 г/л Fe, 20 г/л Zn, 20 г/л N, 610 г/л SiO₃



Лебозол®-Желязо-Цитрат ГОЛД

Разтвор на желязен тор
Съдържание: 90 г/л Fe, 35 г/л Mn, 50 г/л N, 2 г/л Zn