



Продуктова информация



Lebosol® - Робустус СК

ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ТЕЧЕН НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МИКРОЕЛЕМЕНТИ
N (Ca, Mg) тор с микроелементи, 1,8 (+14,6 +1,7) в суспензия

1,8 % общ азот като амиден азот (25 гр/л N)
14,6 % общ калциев оксид (215 гр/л CaO)
1,7 % общ магнезиев оксид (25 гр/л MgO)
7,0 % общ бор като калциев борат (100 гр/л B)

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	За снабдяване с бор, транспортиране на калций, качество на полените, добив, качество на цъфтежа, качество на плода, фотосинтетичен капацитет	0,05 - 0,300 л/дка (При листно торене в 20-40 л. вода. При пръскане с гръбна/ръчна пръскачка 0,5 %ен р-р.)	при необходимост
При всички култури	Повече жизненост (напр. слана по цветовете)	1 - 2 пъти 0,200 л/дка (Най-добро действие в комбинация с 0,200 л/дка Аминозол + 0,500 л/дка Калий 450)	при необходимост

Лебозол® България ООД
ул. Метро 5 • 5800 Плевен
телефон: 064 988 041
info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	за снабдяване с бор	0,050 - 0,300 л/дка (При листно торене в най-малко 20 - 40 литра вода. При пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,5 %-ен разтвор)	при необходимост
Житни култури	Усвояване за азот, здравина на стъблото, качество на посева, зимоустойчивост	1 - 2 пъти 0,05 - 0,150 л/дка	от 3-ти лист
Житни култури	добив, качество	1 - 2 пъти 0,050 - 0,100 л/дка	от 3-ти лист до края на братенето
Пасища и ливади	добив, качество	1 - 4 пъти 0,050 - 0,100 л/дка	през пролетта от начало на вегетация
Пасища и ливади	Усвояване за азот, жизненост, здравина на стъблото, зимоустойчивост	1 - 4 пъти 0,05 - 0,150 л/дка	по време на вегетационния период
Картофи	вътрешно качество	1 - 2 пъти 0,100 л/дка	от началото на оформяне на реда
Картофи	Усвояване за азот, вътрешно качество, здравина на обелката	1 - 3 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	от 6-ти лист
Бобови култури	цъфтеж, завръз на плодове	2 пъти 0,100 л/дка	от 6-ти лист
Бобови култури	Завръз на плодове, усвояване за азот, повече жизненост (напр. при студено време), съдържание на протеин	2 пъти 0,200 л/дка	от 6-ти лист
Царевица	енергийна плътност, залагане на зърно, добив на зърно, качество на полените	0,200 л/дка	от 4-ти лист
Царевица	Енергийна плътност, усвояване за азот, повече жизненост (напр. при студено време)	1 - 2 пъти 0,200 л/дка	от 4-ти лист
Рапица	равномерен цъфтеж и узряване, добив, устойчивост при презимуване	0,2 - 0,3 л/дка	през есента от 4-ти лист

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Рапица	равномерен цъфтеж и узряване, добив	1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка	през пролетта от начало на вегетация до начало на цъфтеж
Рапица	Здравина на стъблото, твърдост на шушулката, студоустойчивост, равномерно съзряване, маслено съдържание, зимоустойчивост	2 - 4 пъти 0,300 - 0,400 л/дка	от 4-ти лист
Слънчоглед	Качество на листото, здравина на стъблото, усвояване за азот, жизненост(напр. при студено време), равномерно съзряване, маслено съдържание	1 - 2 пъти 0,200 л/дка	от 4-ти лист
Слънчоглед	добив, качество на полените	0,200 л/дка	от 4-ти лист
Захарно цвекло	усвояване за азот, повече жизненост (напр.студ) , както и срещу гниене на сърцевината и сухо гниене, съдържание на захар	1 - 3 пъти 0,300 - 0,400 л/дка	от 6-ти лист
Захарно цвекло	добив, срещу сухо гниене и гниене на сърцевината, качество	1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка	от 6-ти лист
Ягоди	качество на растенията в размножителните участъци: образуване на отводи, здрави растения	2 пъти 0,100 л/дка	14 и 7 дни преди изваждане на младите растения за разсад
Ягоди	Срещу деформиране на плода, съдържание на захар, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост	1 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка	от зелена пъпка
Ягоди	срещу деформация на плода, цъфтеж, завръз на плодове	1 - 2 пъти 0,100 л/дка	от зелена пъпка
Ягоди	залагане на цветни пъпки, качество на цвета, устойчивост при презимуване	0,200 л/дка	през есента при засаждане

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Ягоди	качество на растенията в размножителните участъци: образуване на отводи, зdravi растения	2 пъти 0,200 л/дка	14 и 7 дни преди изваждане на младите растения за разсад
Семкови плодове	цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плод, нарастване на Polenovata тръбичка, качество на кората	1 - 2 пъти 0,100 л/дка (и 1 - 2 пъти 0,100 л/ дка от големина на орех)	от червена пъпка да начало на цъфтеж
Семкови плодове	Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост	2 - 4 пъти 0,200 л/дка	Червени пъпки
Костилкови плодове	цъфтеж, завръз на плодове	1 - 2 пъти 0,100 л/дка	от начало на цъфтеж
Костилкови плодове	Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост	2 - 3 пъти 0,200 л/дка	от завръз на плодове
Храстовидни плодове	Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост	1 - 3 пъти 0,200 л/дка	При започване растежа на леторастите
Храстовидни плодове	цъфтеж, завръз на плодове	1 - 2 пъти 0,100 л/дка	преди цъфтеж
Десертно грозде	Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост, равномерно съзряване	2 - 3 пъти 0,200 л/дка	От нарастване на леторастите
Десертно грозде	равномерен цъфтеж и узряване, завръз на плодове	2 пъти 0,100 л/дка	от уголемяване на разклоненията до начало на цъфтеж
Овошки	качествен цъфтеж, възстановяване, натрупване на хранителни резерви, студоустойчивост	2 пъти 0,100 л/дка	след беритба
Винено грозде	Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост, равномерно съзряване	2 - 3 пъти 0,200 л/дка	От нарастване на леторастите

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Винено грозде	равномерен цъфтеж и узряване, завръз на плодове	2 пъти 0,100 л/дка	от уголемяване на разклоненията до начало на цъфтеж
Плодни зеленчуци	цъфтеж, завръз на плодове	1 - 2 пъти 0,200 л/дка	преди цъфтеж при достатъчна листна маса
Зелеви, листни и лукови зеленчуци	срещу некроза на сърцевината при зеле, салата и т.н., вътрешно качество	2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Аспержи	качество (цепнатини, кухини, качество на обвивката)	2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Кореноплодни и клубеноплодни зеленчуци	качество (цепнатини, кухини, вътрешно гниене)	2 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Зеленчуци	Качество на листото, здравина на стъблото, усвояване за азот, жизненост(напр. при студено време), равномерно съзряване, маслено съдържание	2 - 4 пъти 0,200 - 0,300 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Цитрусови култури	Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимоустойчивост	2 - 4 пъти 0,200 л/дка	от бели пъпки
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	Качество на листото, здравина на стъблото, усвояване за азот, жизненост(напр. при студено време), равномерно съзряване, маслено съдържание	2 - 4 пъти 0,200 - 0,300 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки	добив, качество	1 - 2 пъти 0,200 - 0,300 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Хмел	развитие на пъпки и леторасти, качество	3 - 5 пъти 0,200 - 0,300 л/дка	0,5 м височина до беритба

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Хмел	развитие на пъпки и леторасти, качество	3 - 5 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	от 0,5 м височина на растението до начало на цъфтеж
Тютюн	Усвояване за азот, жизненост, качество на листата	1 - 3 пъти 0,200 - 0,300 л/дка	от 4-ти лист
Коледни дръвчета	Усвояване на азот, качество на игличките, жизненост, зимостойчивост	1 - 2 пъти 0,200 л/дка	от разлистване
Декоративни растения	добив, качество	1 - 2 пъти 0,100 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Декоративни растения	Усвояване за азот, жизненост, качество на листата	1 - 2 пъти 0,100 - 0,200 л/дка	при достатъчно развита листна маса
Тревни настилки	Усвояване за азот, жизненост, здравина на стъблото, устойчивост на замръзване	1 - 4 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	по време на вегетационния период
Ядки	Завръз на плодове, качество на обвивката, залагане на цветни пъпки, зимостойчивост	1 - 3 пъти 0,200 л/дка	От набъбване на пъпки
Памук	Завръз на плодове, залагане на цветни пъпки, зимостойчивост	1 - 3 пъти 0,200 л/дка	от 4-ти лист
Ориз	Усвояване за азот, здравина на стъблото, качество на посева, повече жизненост (напр. при студено време)	1 - 2 пъти 0,05 - 0,100 л/дка	от 3-ти лист