

Нашите препоръки за оптимално снабдяване с хранителни вещества на семкови плодове:

За какво?	Какво?	Кога?						
		Червена пъпка	Балон	Край на цъфтеж	Големина на лешник	Големина на орех	Беритбена зрялост	След беритба
✓ По-малко горчиви ядки ✓ Завръз ✓ Големина и цвят на плода	Аминозол® (VBO)	2 пъти 500 – 750 мл/дка						2 пъти 200 мл/дка
✓ Качествен цъфтеж ✓ Завръз ✓ Транспорт на калций	Лебозол®-Цинк 700 СК + Лебозол®-Робустус СК	2 – 4 пъти 50 – 100 мл/дка + 200 мл/дка						2 x 50 мл/дка + 200 мл/дка
✓ Повече жизненост (напр. мраз при цъфтеж)	Аминозол® + Лебозол-Робустус СК+ Лебозол®-Калий 450	1 – 2 пъти 200 мл/дка + 200 мл/дка + 500 мл/дка						
✓ Намален стрес от слънч.лъчение ✓ Качество на листото ✓ Зелен основен цвят	Лебозол®-Манган 500 СК (VBO)	2 – 4 пъти 50 – 100 мл/дка						
✓ По-добър фотосинтез ✓ Срещу ранен листопад ✓ Качество на листото	Лебозол®-Магнезий 400 СК (VBO)	1 – 2 пъти 300 – 500 мл/дка				2 – 3 пъти 300 – 500 мл/дка		
✓ Намален стрес от суша ✓ Добро складиране и транспорт	Лебозол®-Силиций		2 – 4 пъти 100 мл/дка					
✓ Лъскава обвивка ✓ Оцветяване ✓ Намален стрес от слънч.лъчение	Авитар® (VBO)			3 – 4 пъти 400 – 600 мл/дка				
✓ По-добър фотосинтез ✓ Срещу ранен листопад ✓ Жизненост	Лебозол®-Калций-Форте СК			4 – 6 пъти 400 – 800 мл/дка				
✓ Оцветяване на плода ✓ Големина и здравина на плода ✓ Зимоустойчивост	Лебозол®-ПК-Макс					2 – 4 пъти 600 – 800 мл/дка		

Топ 3 на най-предпочитаните Лебозол®-продукти за семкови:



Авитар®

Органичен NK-тор с антистрес действие

Съдържание:

47 г/л N, 24 г/л K₂O



Лебозол®-Калций

Концентриран разтвор на калций за здрави плодове

Съдържание:

220 г/л CaO



Лебозол®-Робустус СК

Торова суспензия с микроелементи N (Ca, Mg) 1,8 (+14, 6+1, 7)

Съдържание:

125 г/л N, 214 г/л CaO, 100 г/л B, 25 г/л MgO

