

Lebosol 



Повече от 30 години опит в храненето на растения

АМИНОЗОЛ®

Вдъхновен от природата,
оптимизиран за селското стопанство.

Съдържание: 9,4 % общ азот (115 г/л N); 1,1 % общ калиев оксид (15 г/л K₂O);
Допълнително се съдържат: 0,25 % обща сяра (S) (от които 0,23 % водоразтворима);
1,28 % общ натрий (Na) (от които 1,26 % водоразтворим); 66,3 % органична субстанция

Действието на Аминозол® накратко

- ✓ **Съдържа повече от 20 различни аминокиселини**
- ✓ **Висока концентрация на усвоими от растенията L-аминокиселини**
- ✓ **Със съдържание на приблизително 58% аминокиселини и пептиди**
- ✓ **Повишава устойчивостта на растенията срещу стрес**
- ✓ **По-бързо възстановяване при неблагоприятни условия**
- ✓ **Повече добив и качество**
Аминокиселини/фитохормони за равномерно развитие
- ✓ **40 години доказано успешно приложение без аналог**



Функции на аминокиселините, съдържащи се в Aminosol® - комбиниран екстракт от множество отделни компоненти

1

Развитие на корена

Л-метионин, Л-аргинин

2

Подобрява устойчивостта на стрес

Л-пролин, Л-валин,
Л-лизин,
Л-глутаминова киселина,
Л-цистеин,
Л-фенилаланин

4

Прекурсори на пигменти

Л-фенилаланин
(участват при образуване на
пигменти)

3

Прекурсори на хормони

Л-триптофан, Л-метионин
(участват при образуване
на хормони)

5

Регулатори на осмотичния потенциал

Л-пролин

6

Антиоксиданти

Л-цистеин, Л-глицин,
Л-триптофан, Л-лизин,
Л-метионин, Л-треонин,
Л-фенилаланин

Начинът на производство е решаващ:

Аминозол® е произведен чрез щадяща ензимна хидролиза на протеин. Това гарантира широк спектър от аминокиселини, които в много голяма част са L-аминокиселини (само те са усвоими от растението).





AMINOSOL®

опити и резултати



106
опита



40
години

15%
по-висока реколта



36
култури



11
държави



106 полски опита, в 36 култури, на територията на 11 страни, в продължение на близо 40 години (1985 – 2024), е постигната средна добавена стойност от около 15%.




Резултат от опит с Аминозол®

Насърчаване на растежа след засаждане на целина

LVG Auweiler-Friesdorf, провинция Северен Рейн-Вестфалия, Германия

Тегло на луковицата в g




Контрола



Повишение (Поливка с 0,2 % -ен разтвор на Аминозол®, 2 x листно торене с 0,3 % -ен разтвор на Аминозол®)

Реализиран добив в dt/ha



🌱 Резултат

Използването на **Аминозол®** значително подобри теглото и качеството на грудките. В резултат на това беше постигнат **22% по-висок добив**.

Препоръки за употреба на Аминозол®:



Зеленчуци

- Цел** Начално развитие, прираст, образуване на корени, предотвратяване петна от пръски
- Препоръка** 0,500 - 1 л/дка (или потапяне на тавите в 1% разтвор или поливане на растението с лейка с 0,5% разтвор)
- Момент** 7 - 10 дни след разсаждане



Житни култури

- Цел** Начално развитие, добив, жизненост
- Препоръка** 0,100 – 0,300 л/дка
- Момент** От 3-ти лист



При всички култури

- Цел** Устойчивост на стрес, добив, възстановяване, воден баланс, коренообразуване, подобрен прием на хранителни вещества, намалява стреса от слънчева радиация (антиоксидант)
- Препоръка** 1 - 4 пъти 0,100 - 0,300 л/дка (При приложение с ръчна пръскачка 0,3 - 0,5 %-ен разтвор)
- Момент** При стрес

На нашата интернет страница www.lebosol.bg може да откриете пълната информация за продукта, както и всички препоръки за употреба.



С удоволствие ще ви консултираме!



Обадете се на:
064 988 041



Използвайте нашата форма за контакт:
www.lebosol.bg



Изпратете ни e-mail:
info@lebosol.bg

Останете свързани с нас и чрез нашите канали в социалните медии:



www.lebosol.bg

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 · 5800 Плевен · Телефон: 064 988 041 · info@lebosol.bg

© Copyright Lebosol® Dünger GmbH 2023 -

Всички съдържания, особено текст, снимки и графики са със защитени авторски права. Всички права относно размножаването, публикуването, обработката и превода, са запазени.