

Задачи	Время обработки	Рекомендации
Повышение эффективности СЗР и устойчивости к ним	совместно с СЗР	0,3-0,5 л/га Аминозол®
Урожайность, укрепление соцветий	в фазу 3-го листа до ягод размером с горошину	2-3 раза 1-2 л/га Аминозол®
Оживление и устойчивость к внешним воздействиям	в фазу 3-го листа до фазы смыкания ягод	1-2 л/га Полный уход
Фотосинтез, устойчивость к внешним воздействиям, против искривления грозди	в фазу 3-го листа до фазы начала созревания	3-5 раз 2-3 л/га Лебозол® - Сера 800 или 2-3 раза 2 л/га Л-Экспресс® - МагСофт
Улучшение качества цветения, завязь, транспорт кальция, качество ягод, рост	с начала укрупнения соцветий до начала цветения	2 раза 1-2 л/га Лебозол® - Бор 2 раза 0,25 л/га Лебозол® -Цинк 700
Улучшение качества листьев, уровень фотосинтеза, эффективность азота	с начала формирования соцветий	2-3 раза 1 -2 л/га Лебозол® - Марганец 235
Качество листьев, хлорофилл, предотвращение высыхания год и вялости стеблей	после цветения до смыкания ягод	2-3 раза 2 л/га Лебозол - МагФос
Образование сахара, созревание лозы, качество ягоды, зимостойкость	с фазы смыкания ягод до уборки урожая	2 раза 3-5 л/га Лебозол® - Калий 450 2 раза 1 л/га Лебозол® - Бор