

Задачи	Время обработки	Рекомендации
Повышение эффективности СЗР и устойчивости к ним	со средствами защиты растений и с удобрениями. Содержащими кальций	0,3-1 л/га Аминозол®
Улучшение качества цветения, завязь плодов, транспорт кальция, качество плодов, окраска	с фазы розового бутона до начала цветения	2 раза 1 л/га Лебозол® - Бор 2 раза 0,25 л/га Лебозол® - Цинк 700
Устойчивость к внешним воздействиям	размер плода «лещина», «грецкий орех»	2-4 раза 2 л/га Лебозол® - Полный уход
Улучшение качества листьев, фотосинтез, эффективность азота	с конца цветения до опадания завязи в июне (только при достижении размера «грецкий орех» для сортов, склонных к побурению плодов)	2 раза 1 л/га Лебозол® - Марганец 235
Повышение стрессоустойчивости	от «зеленого конуса» до уборки урожая, при стрессе (холод, засуха)	1-2 л/га Аминозол®
Предотвращение преждевременного опадания листьев, жизнеспособность, качество листьев, фотосинтез	с конца цветения до уборки урожая (только при достижении размера «грецкий орех» для сортов, склонных к побурению плодов)	1 л/га Лебозол® - Магфос, Марганец 235
Приобретение изначальной зеленой окраски	в период между опаданием завязи в июне и уборкой урожая	2-4 раза 1 л/га Лебозол® - Марганец 235
Приобретение окончательной красной окраски, размер и крепость плода	в период между формированием завязи в июне и уборкой урожая	2-4 раза 1-3 л/га Лебозол® - Калий 450
Накопление запасных веществ, регенерация, зимостойкость, завязь плодов	после уборки урожая	2 раза 2-3 л/га Аминозол® + 0,5 л/га Лебозол® - Цинк 700 + 1 л/га Лебозол® - Бор