



Produktinformation



Lebosol®-Mangan 160

Anorganisches Einnährstoff-Spurennährstoff-Düngemittel
Spurennährstoff-Düngerlösung

11,6 % Mangan als wasserlösliches Sulfat (160 g/l Mn)

Zusätzlich ist enthalten: 6,8 % Wasserlöslicher Schwefel (95 g/l S)

Pflanzen, die unzureichend mit Nährstoffen versorgt sind, sind anfälliger gegenüber Krankheiten.
Blattdüngung gewährleistet eine effektive und schnelle Nährstoffversorgung.

Kultur	Ziel/Problem	Empfehlung	Zeitpunkt
Wintergetreide	Ertrag, N-Effizienz, Photosyntheseleistung, Winterhärte	2 – 3 l/ha	Im Herbst ab 3-Blatt-Stadium
Wintergetreide	Bestockung, Ertrag, N-Effizienz, Standfestigkeit	2 – 3 l/ha	Im Frühjahr ab Vegetationsbeginn
Sommergetreide	Bestockung, Ertrag, N-Effizienz, Standfestigkeit	2 mal 2 – 3 l/ha	Ab 3-Blatt-Stadium
Kartoffeln	Schalenqualität, Widerstandskraft	1 – 2 mal 2 – 3 l/ha	Ab Anfang Reihenschluss
Leguminosen	Ertrag, Photosyntheseleistung, Widerstandskraft, Winterhärte	1 – 2 mal 2 l/ha	Ab 6-Blatt-Stadium
Mais	Ertrag, Photosyntheseleistung, Widerstandskraft	2 – 3 l/ha	Ab 4-Blatt-Stadium
Raps	Ertrag, Photosyntheseleistung, Widerstandskraft, Winterhärte	2 l/ha	Im Herbst ab 4-Blatt-Stadium
Raps	Ertrag, Photosyntheseleistung, Widerstandskraft, Winterhärte	1 – 2 mal 2 l/ha	Im Frühjahr ab Vegetationsbeginn bis Anfang Blüte
Erdbeeren	Blattqualität, N-Effizienz, Photosyntheseleistung	2 – 4 mal 1 – 2 l/ha	Im Frühjahr ab Vegetationsbeginn

Lebosol® Dünger GmbH

Wiesengasse 28 • 67471 Elmstein

Telefon: 06328 98494-0

info@lebosol.de • www.lebosol.de

sustainable plant nutrition



Kultur	Ziel/Problem	Empfehlung	Zeitpunkt
Gemüse allgemein	Blattqualität, N-Effizienz, Photosyntheseleistung	2 – 3 mal 1 – 3 l/ha	Sobald ausreichend Blattmasse entwickelt ist
Weihnachtsbäume	Blattqualität, N-Effizienz, Photosyntheseleistung	2 – 4 mal 2 l/ha	Während der Vegetationsperiode
Greens	Bestockung, Blattqualität, Photosyntheseleistung, Standfestigkeit	1 – 5 mal 2 l/ha	Während der Vegetationsperiode

