



Lebosol®-MoBo

Anorganischer Mehrnährstoffdünger
Mineralischer Spurennährstoffdünger in Lösung

11% Bor, wasserlöslich, als Borethanolamin (150 g/l B);
0,55% Molybdän, wasserlöslich, als Natriumsalz (7,5 g/l Mo)
Zusätzlich enthalten: 3,4% Stickstoff

Pflanzen, die unzureichend mit Nährstoffen versorgt sind, sind anfälliger gegenüber Krankheiten.
Blattdüngung gewährleistet eine effektive und schnelle Nährstoffversorgung.

Kultur	Ziel/Problem	Empfehlung	Zeitpunkt
In allen Kulturen	Zur Borversorgung, Calcium-transport, Pollenqualität, Ertrag, Blütequalität, Fruchtqualität, Photosynthese	0,5 – 3 l/ha (als Blattdüngung in 200 – 400 l Wasser. Bei Anwendung mit Rückenspritze 0,5 %.)	Bei Bedarf
In allen Kulturen	Erhöhte Vitalität (z. B. bei Frost zur Blüte)	1–2 mal 2 l/ha (beste Wirkung in Kombination mit 2 l/ha Aminosol® + 5 l/ha Lebosol®-Kalium 450)	Bei Bedarf
In allen Kulturen	Zur Borversorgung, Calcium-transport, Pollenqualität, Ertrag, Blütequalität, Fruchtqualität, Photosynthese	Fertigation	Fragen Sie Ihre Beratung
Getreide	N-Effizienz, Stängelstabilität, Saatgutqualität, Winterhärte	1 – 2 mal 0,5 - 1 l/ha	Ab 3-Blatt-Stadium

Kultur	Ziel/Problem	Empfehlung	Zeitpunkt
Weideland	N-Effizienz, Vitalität, Bestockung, Stammstabilität, Winterhärte	1 – 4 mal 0,5 – 1 l/ha	Während der Vegetationsperiode
Kartoffeln	N-Effizienz, innere Qualität, Schalenfestigkeit	1 – 3 mal 1 l/ha	Ab 6-Blatt-Stadium
Leguminosen	Fruchtansatz, N-Effizienz, erhöhte Vitalität (z. B. unter kalten Bedingungen), Proteingehalt	2 mal 1 l/ha	Ab 6-Blatt-Stadium
Mais	Energiedichte, N-Effizienz, erhöhte Vitalität (z. B. unter kalten Bedingungen)	1 – 2 mal 2 l/ha	Ab 4-Blatt-Stadium
Raps	Stabilität der Stängel, Festigkeit der Schale, N-Effizienz, Winterhärte, gleichmäßige Abreife, Ölgehalt	2 – 4 mal 2 – 3 l/ha	Ab 4-Blatt-Stadium
Sonnenblumen	Halmstabilität, N-Effizienz, erhöhte Vitalität (z. B. bei Kälte), gleichmäßige Reifung, Ölgehalt	1 – 2 mal 2 l/ha	Ab 4-Blatt-Stadium
Zuckerrüben	N-Effizienz, erhöhte Vitalität (z. B. bei Kälte), Verhinderung von Herzfäule und Trockenfäule, Zuckergehalt	1 – 3 mal 2 – 3 l/ha	Ab 6-Blatt-Stadium
Erdbeeren	Pflanzenqualität in Saatgutkulturen: Stärkung der Pflanzen, Bildung von Ablegern	2 mal 1 l/ha	14 und 7 Tage vor der Rodung der Jungpflanzen
Erdbeeren	Vermeidung von deformierten Beeren; Zuckergehalt, Entwicklung der Blütenknospen, Winterhärte	1 – 3 mal 1 – 2 l/ha	Ab grüner Knospe
Kernobst	Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenentwicklung, Winterhärte	2 – 4 mal 1 l/ha	Rote Knospe
Steinobst	Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenentwicklung, Winterhärte	2 – 3 mal 1 l/ha	Ab Fruchtansatz
Strauchbeeren	Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenentwicklung, Winterhärte	1 – 3 mal 1 l/ha	Beginn des Triebwachstums
Tafeltrauben	Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenentwicklung, Winterhärte, gleichmäßige Reifung	2 – 3 mal 1 l/ha	Ab Vergrößerung der Blütenstände

Lebosol® Dünger GmbH

Wiesengasse 28 • 67471 Elmstein • Germany

Telefon: +49 6328 98494-0

info@lebosol.de • www.lebosol.de

sustainable plant nutrition



Kultur	Ziel/Problem	Empfehlung	Zeitpunkt
Zitrusfrüchte	Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenentwicklung, Winterhärte	2 – 4 mal 1 l/ha	Weißer Knospe
Weintrauben	Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenentwicklung, Winterhärte, gleichmäßige Reifung	2 – 3 mal 1 l/ha	Ab Vergrößerung der Blütenstände
Heil-, Duft-, und Gewürzpflanzen	Blattqualität, Stängelstabilität, N-Effizienz, Vitalität (z. B. unter kalten Bedingungen), gleichmäßige Reifung, Ölgehalt	2 – 4 mal 1 – 3 l/ha	Sobald ausreichend Blattmasse vorhanden ist
Gemüse allgemein	Blattqualität, Stängelstabilität, N-Effizienz, Vitalität (z. B. unter kalten Bedingungen), gleichmäßige Reifung, Ölgehalt	2 – 4 mal 1 – 3 l/ha	Sobald ausreichend Blattmasse vorhanden ist
Hopfen	Knospen- und Triebentwicklung, Qualität	3 – 5 mal 1 – 2 l/ha	Ab 0,5 m Wuchshöhe
Tabak	N-Effizienz, Blattqualität, Vitalität	1 – 3 mal 1 – 2 l/ha	Ab 4-Blatt-Stadium
Weihnachtsbäume	Nadelqualität, N-Effizienz, Vitalität, Winterhärte	1 – 2 mal 1 l/ha	Ab 4-Blatt-Stadium
Zierpflanzen	N-Effizienz, Blattqualität, Vitalität	1 – 2 mal 1 l/ha	Sobald ausreichend Blattmasse vorhanden ist
Greens	N-Effizienz, Vitalität, Stamm Stabilität, Frostbeständigkeit	1 – 4 mal 0,5 – 1 l/ha	Während der Vegetationsperiode
Nüsse	Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenentwicklung, Winterhärte	1 – 3 mal 1 – 2 l/ha	Schwellende Knospen
Baumwolle	Fruchtansatz, Blütenknospen Entwicklung, Winterhärte	1 – 3 mal 1 – 2 l/ha	Ab Knospe
Reis	N-Effizienz, Stängelstabilität, Saatgutqualität, erhöhte Vitalität (z. B. unter kalten Bedingungen)	1 – 2 mal 0,5 – 0,75 l/ha	Ab 3-Blatt-Stadium
Baumschulen	Regeneration, Winterhärte	2 mal 1 l/ha	Ab Mitte August