



Informations sur le produit



Aminosol®

Engrais NF U42-001, Solution d'engrais azoté organique 9
Engrais NK organique liquide, utilisant des sous-produits animaux de la
catégorie 3, Matériaux selon CE (VO) 1069/2009, protéines hydrolysées

9,4 % Azote total (115 g/l N)

1,1 % Oxyde de potassium total (15 g/l K₂O)

Contient également : 0,25 % de soufre total (S), dont 0,23 % soluble dans l'eau

1,28 % de sodium total (Na), dont 1,26 % soluble dans l'eau

66,3 % matière organique

**Les cultures présentant une carence en nutriments seront plus sensibles aux maladies et au stress abiotique.
La fertilisation foliaire avec des macro-et micro-éléments assurera une nutrition optimisée des plantes.**

Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Dans toutes les cultures	Augmentation de la vitalité (par exemple pendant le gel pour la floraison)	1 – 2 fois 2 l/ha (Meilleur effet en combinaison avec 1 l/ha Lebosol®-Robustus SC)	Si nécessaire
Dans toutes les cultures	Augmentation de la tolérance au stress, du rendement, de la revitalisation, de l'équilibre hydrique, de la formation des racines, de l'amélioration de l'absorption des nutriments, de la réduction du stress radiatif (antioxydant)	1 – 4 fois 2 – 3 l/ha (lors de l'application avec le pulvérisateur à dos 0,3 – 0,5 %)	En cas de stress
Dans toutes les cultures	Traitement des semences avec des nutriments pour un meilleur développement juvénile	0,1 – 0,4 l/dt de semences	Pour le traitement des semences et des plants
Dans toutes les cultures	Renforcement de la tolérance au stress, rendement, revitalisation, équilibre hydrique, formation des racines, amélioration de l'absorption des nutriments, réduction du stress radiatif (antioxydant)	Fertigation	Demandez conseil à votre conseiller spécialisé !
Pommes de terre	Récupération plus rapide de la plante après le retrait du film pour les pommes de terre primeurs	2 – 3 l/ha	Après le retrait du film

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléfon: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Fraises	Qualité des plants dans les cultures de multiplication : formation de stolons, plants vigoureux	2 fois 2 – 3 l/ha	14 et 7 jours avant l'arrachage des jeunes plants
Fraises, légumes	Formation des racines, croissance, développement initial	Plonger les plantes dans une solution à 1% ou arroser alternativement à raison de 5 – 10 l/ha	Avant le nouveau repiquage ou alternativement 7 – 10 jours après le repiquage
Fraises	Nouaison, qualité	2 – 3 fois 5 – 7,5 l/ha	À partir du début de la floraison, à 8 jours d'intervalle
Fruits à pépins	Augmentation du taux de nouaison, de la taille et de la coloration des fruits, minimisation du roussissement	2 fois 5 – 7,5 l/ha	Pour les pommes : premier stade rose et rose complet. Poires : avant et après la floraison
Fruits à noyau	Augmentation de taux de nouaison, croissance des fruits, moins de ruissellement des cerises	3 fois 5 – 7,5 l/ha	Dès la fin de la floraison à intervalles de 8 jours
Fruits à noyau	Contre les symptômes foliaires et fruitiers dus à la sharka	3 fois 5 – 7,5 l/ha (sans produit phytosanitaire)	À partir de la floraison, à 30 jours d'intervalle
Baies arbustives	Nouaison, qualité	2 – 3 fois 5 – 7,5 l/ha	À partir du début de la floraison, à 8 jours d'intervalle
Raisins de table	Développement homogène, nouaison, maturité uniforme	4 fois 3 – 5 l/ha	Après le débourrement, à pleine floraison, après la floraison, à la fermeture de la grappe
Les agrumes	Mise à fruit, qualité	2 – 3 fois 5 – 7,5l/ha	Dès le début de la floraison à intervalles de 8 jours (dans les installations de rendement)
Fruits à coque	Nouaison, qualité	2 – 3 fois 5 – 7,5 l/ha	À partir du début de la floraison, à 8 jours d'intervalle
Vignes	Développement régulier, nouaison, maturité uniforme	4 fois 3 – 5 l/ha	Après débourrement, en pleine floraison, en post-floraison, lors de fermeture de la grappe
Légumes en général	Développement initial, reprise, formation des racines, prévention des taches de pulvérisation	5 – 10 l/ha (ou trempage des plaques dans une solution à 1 %, ou arrosage des plants par aspersion avec une solution à 0,5 %)	7 – 10 jours après la plantation
Houblon	Développement initial, rendement, vitalité, formation des racines	1 – 3 fois 2 – 3 l/ha	À partir de 0,5 m de hauteur de croissance
Tabac	Développement initial, reprise, formation des racines	5 – 10 l/ha (ou trempage des plaques dans une solution à 1 %, ou arrosage des plants par aspersion avec une solution à 0,5 %)	7 – 10 jours après la plantation

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Sapins de Noël	Reprise, débourrement, formation des racines	Trempage du matériel de départ dans une solution à 1 % ou, alternativement, arrosage avec une solution à 1 %	En cas de besoin
Plantes ornementales	Qualité du feuillage et de la floraison, vitalité, prévention des taches de pulvérisation	1 – 4 fois 100 – 300 ml (pour 100 l de bouillie ou 2 – 3 l/ha)	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Coton	Nouaison, qualité	2 – 3 fois 5 – 7,5 l/ha	À partir du début de la floraison, à 8 jours d'intervalle

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition

