



Informations
sur le produit



Lebosol®-Ammonium TS 200

Engrais minéral liquide simple
Engrais N (S) en solution 15 (+21)

15 % d'azote total (200 g/l N)
(9,3 % d'azote ammoniacal; 5,7 % d'azote uréique)
21,3 % de soufre soluble dans l'eau (280 g/l S)

**Les cultures présentant une carence en nutriments seront plus sensibles aux maladies et au stress abiotique.
La fertilisation foliaire avec des macro-et micro-éléments assurera une nutrition optimisée des plantes.**

Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Toutes cultures	Pour la nutrition azotée et soufrée, vitalité, qualité du feuillage, rendement, teneur en huile, taux de photosynthèse	5 l/ha (dans 200 – 400 l d'eau ; 0,5 – 1 % pour culture normale, 0,25 – 0,5 % pour cultures sensibles sous verre/film) Ne pas utiliser pendant la floraison !	En cas de besoin
Toutes cultures	Pour la nutrition azotée et soufrée, vitalité, qualité du feuillage, rendement, teneur en huile, taux de photosynthèse	Fertigation	Consulter votre conseiller
Céréales	Efficacité N, teneur en protéines, qualité	2 – 4 fois 5 l/ha	À partir du stade 3 feuilles
Prairies	Efficacité N, vitalité	2 – 4 fois 5 l/ha	Pendant la période de végétation
Pommes de terre	Efficacité N, vitalité	2 – 4 fois 5 l/ha	À partir du début de la fermeture des rangs
Légumineuses	Efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid), teneur en protéines	2 – 4 fois 5 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Maïs	Efficacité N, vitalité	1 – 2 fois 5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Colza	Efficacité N, vitalité, teneur en huile	2 – 4 fois 5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Tournesol	Efficacité N, vitalité, teneur en huile	1 – 2 fois 5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France
Telefon: +33 484 896805
Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Betterave sucrière	Efficacité N, vitalité	2 – 4 fois 5 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Plantes médicinales, aromatiques et épices	Efficacité N, teneur en protéines, qualité	2 – 4 fois 5 l/ha	Dès que la masse foliaire est suffisante
Légumes	Efficacité N, teneur en protéines, qualité	2 – 4 fois 5 l/ha	Dès que la masse foliaire est suffisante
Houblon	Efficacité N, vitalité	2 – 4 fois 5 l/ha	À partir de 0,5 m de hauteur de végétation
Cultures de légumes-feuilles	Efficacité N, vitalité	2 – 4 fois 5 l/ha	Pendant la période de végétation
Coton	Efficacité N, vitalité	2 – 4 fois 5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Riz	Efficacité N, teneur en protéines, qualité	2 – 4 fois 5 l/ha	À partir du stade 3 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition

