



Informations
sur le produit

Lebosol®-AqueBoron SC 150

Engrais minéral simple à oligo-élément
Engrais à oligo-éléments en suspension

11 % de bore sous forme de sel de sodium soluble dans l'eau (150 g/l B)

Contient également : 4,6 % de sodium total (62 g/l Na)

**Les cultures présentant une carence en nutriments seront plus sensibles aux maladies et au stress abiotique.
La fertilisation foliaire avec des macro-et micro-éléments assurera une nutrition optimisée des plantes.**

Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Toutes cultures	Pour la nutrition en bore, le transport du calcium, la qualité du pollen, le rendement, la qualité de floraison, la qualité des fruits, le taux de photosynthèse	0,5 – 3 l/ha (pulvérisation foliaire dans 200 – 400 l d'eau. Avec pulvérisateur dorsal : 0,5 %)	En cas de besoin
Toutes cultures	Vitalité accrue (p. ex. lors de gel pendant la floraison)	1 – 2 fois 2 l/ha (meilleur effet en combinaison avec 2 l/ha Aminosol® + 5 l/ha Lebosol®-Potassium 450)	En cas de besoin
Toutes cultures	Pour la nutrition en bore, le transport du calcium, la qualité du pollen, le rendement, la qualité de floraison, la qualité des fruits, le taux de photosynthèse	Fertigation	Consulter votre conseiller
Céréales	Efficacité N, stabilité des tiges, qualité des graines, résistance au froid hivernal	1 – 2 fois 0,5 – 1 l/ha	À partir du stade 3 feuilles
Prairies	Efficacité N, vitalité, tallage, stabilité des tiges, résistance au froid hivernal	1 – 4 fois 0,5 – 1 l/ha	Pendant la période de végétation
Pommes de terre	Efficacité N, qualité interne, fermeté de la peau	1 – 3 fois 1 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Légumineuses	Nouaison, efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid), teneur en protéines	2 fois 1 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Maïs	Densité énergétique, efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid)	1 – 2 fois 2 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Colza	Stabilité des tiges, fermeté des siliques, efficacité N, résistance hivernale, maturation homogène, teneur en huile	2 – 4 fois 2 – 3 l/ha	À partir du stade 4 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléfon: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Tournesol	Stabilité des tiges, efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid), maturation homogène, teneur en huile	1 – 2 fois 2 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Betterave sucrière	Efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid), prévention de la pourriture du cœur et de la pourriture sèche, teneur en sucre	1 – 3 fois 2 – 3 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Fraises	Qualité des plantes en production de plants : plantes vigoureuses, formation de stolons	2 fois 1 l/ha	14 et 7 jours avant l'arrachage des jeunes plants
Fraises	Prévention des baies déformées ; teneur en sucre, développement des bourgeons floraux, résistance hivernale	1 – 3 fois 1 – 2 l/ha	À partir des bourgeons verts

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléfon: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition

