



Informations sur le produit

BIO

MADE IN
GERMANY

Avitar[®]

Engrais organique NK, liquide 4+2
utilisation de sous-produits animaux et de substances végétales

4,1 % Azote total (47 g/l N)

2,1 % Oxyde de potassium total (24 g/l K₂O)

Ingrédients mineurs : 0,19 % de soufre soluble dans l'eau (2,2 g/l S)

0,3 % de sodium hydrosoluble (3,5 g/l Na)

25,8 % bio. Substance

**Les cultures présentant une carence en nutriments seront plus sensibles aux maladies et au stress abiotique.
La fertilisation foliaire avec des macro-et micro-éléments assurera une nutrition optimisée des plantes.**

Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Toutes les cultures	Renforcement de la tolérance au stress, développement racinaire, équilibre hydrique, activité photosynthétique, rendement	1 – 6 fois 2 – 5 l/ha (en application avec pulvérisateur à dos : 1 – 2 %)	Selon les besoins
Toutes les cultures	Traitement nutritif pour un meilleur développement racinaire et un meilleur démarrage de la culture	0,2 – 0,5 l/dt	Pour le traitement des semences et du matériel de plantation
Toutes les cultures	Pour l'apport de calcium, la résistance de la paroi cellulaire, la réduction du stress radiatif (antioxydant), l'amélioration de la qualité des fruits et la stabilité au stockage	5 – 10 l/ha (pour la fertilisation des feuilles avec au moins 500 litres d'eau. En cas d'application avec le pulvérisateur à dos 1 %.)	Si nécessaire
Toutes les cultures	Renforcement de la tolérance au stress, rendement, équilibre hydrique, développement racinaire, activité photosynthétique, réduction du stress dû au rayonnement (antioxydant)	Fertigation	Demandez conseil à votre conseiller
Céréales d'hiver / de printemps	Amélioration de l'absorption des nutriments et de la tolérance au stress, efficacité de l'azote, vitalité	2 – 4 fois 2 – 4 l/ha	À partir du stade 3 feuilles

Lebosol[®] France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Pommes de terre	Amélioration de l'absorption des nutriments et de la tolérance au stress, vitalité, qualité du feuillage, développement juvénile rapide	2 – 4 fois 2 – 4 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Légumineuses	Amélioration de l'absorption des nutriments, qualité des feuilles et des fleurs, tolérance au stress, rendement	1 – 2 fois 2 – 4 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Colza d'hiver / de printemps	Amélioration de l'absorption des nutriments et de la tolérance au stress, réduction du stress dû au rayonnement (antioxydant)	2 – 3 fois 2 – 4 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Maïs	Amélioration de l'absorption des nutriments et de la tolérance au stress, développement juvénile rapide	1 – 2 fois 2 – 4 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Tournesol	Amélioration de l'absorption des nutriments et de la tolérance au stress, réduction du stress dû au rayonnement (antioxydant)	1 – 2 fois 2 – 4 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Fraises	Nouaison, qualité, réduction du stress dû au rayonnement (coup de soleil)	2 – 4 fois 2 – 4 l/ha	Après la plantation ou à partir du débourrement
Fruits à pépins	Nouaison, aspect lisse de l'épiderme, coloration, réduction du stress dû au rayonnement (coup de soleil)	3 – 4 fois 4 – 6 l/ha	À partir de la fin de la floraison
Fruits à noyau	Qualité de la floraison et nouaison, réduction du stress dû au rayonnement	2 – 3 fois 3 – 5 l/ha	À partir du début de la floraison
Petits fruits arbustifs	Qualité de la floraison et nouaison, réduction du stress dû au rayonnement	2 – 3 fois 2 – 4 l/ha	À partir du débournement
Raisins de table	Qualité de la floraison et nouaison, réduction du stress dû au rayonnement	3 – 5 fois 2 – 4 l/ha	À partir de l'allongement des inflorescences
Agrumes	Nouaison, qualité, réduction du stress dû au rayonnement	2 – 4 fois 3 – 5 l/ha	Du stade bouton blanc jusqu'à la récolte
Raisins de cuve	Qualité de la floraison et nouaison, réduction du stress dû au rayonnement	3 – 5 fois 2 – 4 l/ha	À partir de l'allongement des inflorescences
Légumes en général	Amélioration de l'absorption des nutriments, qualité des feuilles et des fleurs, tolérance au stress, rendement	2 – 4 fois 2 – 4 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Plantes médicinales, aromatiques et condimentaires	Amélioration de l'absorption des nutriments, qualité des feuilles et des fleurs, tolérance au stress, rendement	1 – 3 fois 3 – 5 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Sapins de Noël	Amélioration de l'absorption des nutriments et de la tolérance au stress, vitalité, développement racinaire	1 – 3 fois 2 – 4 l/ha	À partir du débournement

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition

