



Informations sur le produit

BIO



Lebosol®-Bore

Engrais inorganique simple avec oligo-élément
Engrais avec oligo-élément en solution

11 % Bore sous forme de boréthanolamine soluble dans l'eau (150 g/l B)

Contient également : 3,46 % d'azote (N)

**Les cultures présentant une carence en nutriments seront plus sensibles aux maladies et au stress abiotique.
La fertilisation foliaire avec des macro-et micro-éléments assurera une nutrition optimisée des plantes.**

Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Toutes cultures	Apport en bore, transport du calcium, qualité du pollen, rendement, qualité des fleurs, qualité des fruits, efficacité de la photosynthèse	0,5 – 3 l/ha (en pulvérisation foliaire dans 200 – 400 l d'eau. En application avec pulvérisateur dorsal : solution à 0,5 %)	Si nécessaire
Toutes cultures	Plus de vitalité (p. ex. en cas de gel pendant la floraison)	1 – 2 applications de 1 l/ha (efficacité optimale en combinaison avec 2 l/ha d'Aminosol® + 5 l/ha de Lebosol® Potassium 450)	Si nécessaire
Toutes cultures	Apport en bore, transport du calcium, qualité du pollen, rendement, qualité des fleurs, qualité des fruits, efficacité de la photosynthèse	Fertigation	Consultez votre conseiller technique
Céréales d'hiver et de printemps	Efficacité de l'azote, stabilité des tiges, qualité des semences, résistance à l'hiver	1 – 2 applications de 0,5 – 1 l/ha	À partir du stade 3 feuilles
Prairies	Efficacité de l'azote, vitalité, stabilité des tiges, résistance à l'hiver	1 – 4 applications de 0,5 – 1 l/ha	Pendant la période de végétation
Pommes de terre	Efficacité de l'azote, qualité interne, fermeté de la peau	1 – 4 applications de 1 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Légumineuses	Rendement, efficacité de l'azote, plus de vitalité (p. ex. par temps froid), teneur en protéines	2 applications de 1 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Maïs	Densité énergétique, efficacité de l'azote, rendement, plus de vitalité (p. ex. par temps froid)	1 – 2 applications de 2 l/ha	À partir du stade 4 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Colza d'hiver et de printemps	Stabilité des tiges, résistance des siliques, efficacité de l'azote, résistance à l'hiver, maturation homogène, teneur en huile	2 – 4 applications de 2 – 3 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Tournesol	Stabilité des tiges, efficacité de l'azote, plus de vitalité (p. ex. par temps froid), maturation homogène, teneur en huile	1 – 2 applications de 2 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Betteraves sucrières	Efficacité de l'azote, plus de vitalité (p. ex. par temps froid), contre la pourriture du cœur et la pourriture sèche, teneur en sucre	2 – 3 applications de 2 – 3 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Fraises	Contre les fruits déformés, teneur en sucre, formation des boutons floraux, résistance à l'hiver	1 – 3 applications de 1 – 2 l/ha	À partir du bouton vert
Fraises	Qualité des plantes dans les cultures de multiplication : formation de stolons, plantes vigoureuses	2 applications de 1 l/ha	14 et 7 jours avant l'arrachage des jeunes plants
Fruits à pépins	Nouaison, qualité de l'épiderme, formation des boutons floraux, résistance à l'hiver	2 – 4 applications de 1 l/ha	À partir du bouton rose
Fruits à noyau	Nouaison, qualité de l'épiderme, formation des boutons floraux, résistance à l'hiver	2 – 3 applications de 1 l/ha	À partir de la nouaison
Petits fruits	Nouaison, qualité de l'épiderme, formation des boutons floraux, résistance à l'hiver	1 – 3 applications de 1 l/ha	Début de croissance des pousses
Raisins de table	Nouaison, qualité de l'épiderme, formation des boutons floraux, résistance à l'hiver, maturation homogène	2 – 3 applications de 1 l/ha	À partir de l'allongement des grappes
Agrumes	Nouaison, qualité de l'épiderme, formation des boutons floraux, résistance à l'hiver	2 – 4 applications de 1 l/ha	À partir du bouton blanc
Arboriculture en général	Qualité de la floraison, régénération, accumulation des réserves, résistance à l'hiver	2 applications de 1 – 2 l/ha	Après la récolte
Fruits à coque	Nouaison, qualité de l'épiderme, formation des boutons floraux, résistance à l'hiver	1 – 3 applications de 1 – 2 l/ha	À partir du gonflement des bourgeons
Raisins de cuve	Nouaison, qualité de l'épiderme, formation des boutons floraux, résistance à l'hiver, maturation homogène	2 – 3 applications de 1 l/ha	À partir de l'allongement des grappes
Légumes-fruits	Floraison, nouaison	1 – 2 applications de 2 l/ha	Avant la floraison lorsque la masse foliaire est suffisante
Choux, légumes-feuilles et légumes bulbes	Contre la nécrose du cœur dans les choux, laitues, etc., qualité interne	2 – 3 applications de 2 – 3 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Asperges	Qualité (fentes, tiges creuses, qualité de la peau)	2 – 3 applications de 2 – 3 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Légumes-racines et tubercules	Qualité (fentes, tubercules creux, brunissement interne)	2 – 3 applications de 2 – 3 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Légumes en général	Qualité des feuilles, stabilité des tiges, efficacité de l'azote, vitalité (p. ex. par temps froid), maturation homogène, teneur en huile	2 – 4 applications de 1 – 3 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Plantes médicinales, aromatiques et condimentaires	Qualité des feuilles, stabilité des tiges, efficacité de l'azote, vitalité (p. ex. par temps froid), maturation homogène, teneur en huile	2 – 4 applications de 1 – 3 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Houblon	Développement des bourgeons et des pousses, qualité	3 – 5 applications de 1 – 2 l/ha	À partir de 0,5 m de hauteur
Tabac	Efficacité de l'azote, vitalité, qualité des feuilles	1 – 3 applications de 1 – 2 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Sapins de Noël	Qualité des aiguilles, efficacité de l'azote, vitalité, résistance à l'hiver	1 – 2 applications de 1 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Plantes ornementales	Efficacité de l'azote, vitalité, qualité des feuilles	1 – 2 applications de 1 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Greens (golfs)	Efficacité de l'azote, vitalité, stabilité des tiges, résistance au gel	1 – 4 applications de 0,5 – 1 l/ha	Pendant la période de végétation
Coton	Nouaison, formation des boutons floraux, résistance à l'hiver	1 – 3 applications de 1 – 2 l/ha	À partir du démarrage de la végétation
Riz	Efficacité de l'azote, stabilité des tiges, qualité des semences, plus de vitalité (p. ex. par temps froid)	1 – 2 applications de 0,5 – 0,75 l/ha	À partir du stade 3 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition

