



Informations
sur le produit



Lebosol®-Calcium

Engrais minéral liquide simple à macronutriment
Engrais calcique (+17) en solution

16,7 % oxyde de calcium (220 g/l CaO)

**Les cultures présentant une carence en nutriments seront plus sensibles aux maladies et au stress abiotique.
La fertilisation foliaire avec des macro-et micro-éléments assurera une nutrition optimisée des plantes.**

Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Toutes les cultures	Pour l'apport en calcium	5 – 10 l/ha (avec engrais foliaire dans au moins 500 l d'eau. Lors d'une application avec un pulvérisateur à dos, 1 %).	Uniquement dans les cultures insensibles au chlorure !
Pommes de terre	Qualité des tubercules et de la peau, amélioration de la durée de conservation	3 fois 5 l/ha	À partir du début de la fermeture des rangs
Fraises	Augmentation de la fermeté des fruits, de la stabilité de conservation et de la résilience	3 – 4 fois 5 l/ha	De la nouaison à la récolte
Fruits à pépins	Augmentation de la fermeté des fruits, de la stabilité de conservation et de la résilience	4 – 6 fois 5 à 10 l/ha	De la taille d'une noix à la récolte
Fruits à noyau	Augmentation de la fermeté des fruits, de la stabilité au stockage et de la résilience	2 – 5 fois 5 – 10 l/ha	De la nouaison à la récolte
Petits fruits	Augmentation de la fermeté des fruits, de la stabilité au stockage et de la résilience	3 – 4 fois 5 l/ha	De la nouaison à la récolte
Raisins de table	Augmentation de la fermeté des fruits, de la stabilité au stockage et de la résilience	3 fois 5 l/ha	De la taille d'un petit pois à la récolte
Raisins de cuve	Augmentation de la fermeté des fruits, de la stabilité au stockage et de la résilience.	3 – 5 fois 5 l/ha	De la taille d'un petit pois à la récolte

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléfon: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Légumes-fruits	Prévention de la brûlure des extrémités, fermeté des fruits, stabilité au stockage, résilience.	3 – 4 fois 5 l/ha	À partir de la nouaison
Choux, légumes-feuilles et bulbes	Prévention de la brûlure des extrémités et de la nécrose apicale, amélioration du stockage, résilience.	3 – 4 fois 5 – 10 l/ha	Une fois que la masse foliaire est suffisamment développée
Asperges	Augmentation de la durée de conservation, résistance	2 – 4 fois 5 – 10 l/ha	Une fois que la masse foliaire est suffisamment développée
Légumes-racines et tubercules	Augmentation de la fermeté des fruits, de la stabilité au stockage et de la résistance	3 – 4 fois 5 – 10 l/ha	Une fois que la masse foliaire est suffisamment développée
Plantes médicinales, aromatiques et épicées	Augmentation de la fermeté des fruits, de la stabilité de conservation et de la résilience	2 – 4 fois 5 – 10 l/ha	Une fois que la masse foliaire est suffisamment développée ou de la fin de la floraison à la récolte

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition

