



Informations
sur le produit



Lebosol®-HeptaZinc

Engrais minéral simple à oligo-élément
Engrais complexe à oligo-éléments

6 % de zinc soluble dans l'eau, complexé par HGA (80 g/l Zn)

**Les cultures présentant une carence en nutriments seront plus sensibles aux maladies et au stress abiotique.
La fertilisation foliaire avec des macro-et micro-éléments assurera une nutrition optimisée des plantes.**

Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Toutes cultures	Pour la nutrition en zinc, l'équilibre phytohormonal, la qualité de floraison, la fécondation, le rendement, l'équilibre énergétique, le taux de photosynthèse, la réduction du stress lumineux (antioxydant)	Applications répétées de 1 – 3 l/ha (dans au moins 200 l d'eau. Avec pulvérisateur dorsal : 0,5 – 1 %)	En cas de besoin
Toutes cultures	Pour la nutrition en zinc, l'équilibre phytohormonal, la qualité de floraison, la fécondation, le rendement, l'équilibre énergétique, le taux de photosynthèse, la réduction du stress lumineux (antioxydant)	Fertigation	Consulter votre conseiller
Toutes cultures	Traitement des semences avec nutriments pour un meilleur développement précoce et la vitalité	0,2 – 0,3 l/dt	Pour l'enrobage des semences/plants
Céréales	Efficacité N, qualité de floraison, fécondation, tolérance au stress, vitalité	1 – 3 fois 2 – 3 l/ha	À partir du stade 3 feuilles
Céréales	Efficacité N, qualité de floraison, fécondation, tolérance au stress, vitalité	1 – 3 fois 2 – 3 l/ha	À partir du stade 3 feuilles
Prairies	Efficacité N, tolérance au stress, vitalité	2 – 5 fois 1 – 3 l/ha	Pendant la période de végétation
Pommes de terre	Efficacité N, développement rapide en début de cycle, qualité de la peau, tolérance au stress	2 – 4 fois 2 – 3 l/ha	À partir du début de la fermeture des rangs
Légumineuses	Efficacité N, qualité de floraison, fécondation, tolérance au stress, vitalité	1 – 2 fois 2 – 3 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Maïs	Efficacité N, qualité de floraison, fécondation, tolérance au stress, vitalité	1 – 2 fois 2 – 3 l/ha	À partir du stade 4 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France
Telefon: +33 484 896805
Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Colza	Efficacité N, qualité de floraison, fécondation, tolérance au stress, vitalité	2 – 3 fois 2 – 3 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Tournesol	Efficacité N, qualité de floraison, fécondation, tolérance au stress, vitalité	1 – 2 fois 2 – 3 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Betterave sucrière	Efficacité N, tolérance au stress, vitalité	1 – 3 fois 2 – 3 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Fraises	Qualité de floraison, transport du calcium, synthèse des vitamines, nouaison, qualité des fruits	2 – 4 fois 2 – 3 l/ha	À partir des bourgeons verts
Fruits à pépins	Qualité de floraison, transport du calcium, synthèse des vitamines, nouaison, qualité des fruits	2 – 4 fois 2 – 3 l/ha	Du stade bouton rouge jusqu'à la récolte
Fruits à noyau	Qualité de floraison, transport du calcium, synthèse des vitamines, nouaison, qualité des fruits	2 – 4 fois 2 – 3 l/ha	À partir de la nouaison
Petits fruits	Qualité de floraison, transport du calcium, synthèse des vitamines, nouaison, qualité des fruits	2 – 4 fois 2 – 3 l/ha	Début de la croissance des pousses
Raisins de table	Qualité de floraison, transport du calcium, synthèse des vitamines, nouaison, qualité des fruits	2 – 4 fois 2 – 3 l/ha	Inflorescences visibles
Agrumes	Qualité de floraison, transport du calcium, synthèse des vitamines, nouaison, qualité des fruits	2 – 4 fois 2 – 3 l/ha	Du stade bouton blanc jusqu'à la récolte
Raisins à vin	Qualité de floraison, transport du calcium, synthèse des vitamines, nouaison, qualité des fruits	2 – 4 fois 2 – 3 l/ha	Inflorescences visibles
Plantes médicinales, aromatiques et épices	Efficacité N, qualité de floraison, nouaison, qualité des fruits, transport du calcium, qualité interne	2 – 4 fois 1 – 3 l/ha	Dès que la masse foliaire est suffisante
Légumes	Efficacité N, qualité de floraison, nouaison, qualité des fruits, transport du calcium, qualité interne, synthèse des vitamines	2 – 4 fois 2 – 3 l/ha	Dès que la masse foliaire est suffisante
Houblon	Efficacité N, qualité de floraison, nouaison	1 – 4 fois 2 – 3 l/ha	À partir de 0,5 m de hauteur de végétation
Tabac	Efficacité N, tolérance au stress, vitalité	1 – 3 fois 1 – 3 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Sapins de Noël	Efficacité N, tolérance au stress, vitalité	2 – 4 fois 1 – 3 l/ha	À partir du débourrement
Plantes ornementales	Qualité du feuillage et de la floraison, efficacité N, tolérance au stress, vitalité	2 times 1 – 2 l/ha	Dès que la masse foliaire est suffisante
Cultures de légumes-feuilles	Efficacité N, tolérance au stress, vitalité	2 – 5 fois 2 – 3 l/ha	Pendant la période de végétation
Fruits à coque	Qualité de floraison, transport du calcium, synthèse des vitamines, nouaison, qualité des fruits	2 – 5 fois 2 – 3 l/ha	À partir du gonflement des bourgeons
Coton	Qualité de floraison, transport du calcium, nouaison, qualité, résistance hivernale	2 – 3 fois 2 – 3 l/ha	À partir du débourrement
Riz	Efficacité N, qualité de floraison, fécondation, tolérance au stress, vitalité	1 – 3 fois 2 – 3 l/ha	À partir du stade 3 feuilles

