



Informations
sur le produit



Lebosol®-Magphos

Engrais macronutriment composé inorganique liquide
Solution d'engrais NP (Mg) 3-30 (+7)

3 % d'azote total sous forme d'azote uréique (45 g/l N)

30 % d'anhydride phosphorique total sous forme hydrosoluble (450 g/l P₂O₅)

6,8 % d'oxyde de magnésium sous forme hydrosoluble (100 g/l MgO)

**Les cultures présentant une carence en nutriments seront plus sensibles aux maladies et au stress abiotique.
La fertilisation foliaire avec des macro-et micro-éléments assurera une nutrition optimisée des plantes.**

Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Toutes les cultures	Pour la nutrition du phosphore et du magnésium, le transport du phosphore, le rendement, l'augmentation de la vitalité (par exemple dans des conditions froides), l'efficacité de l'azote, le bilan énergétique et le taux de photosynthèse, la formation des racines	5 – 10 l/ha (comme fertilisation foliaire dans au moins 200 l d'eau. Lors de l'application avec un pulvérisateur à dos 1%). Ne pas utiliser pendant la floraison!	Si nécessaire
Céréales d'hiver / de printemps	Qualité du grain, teneur en protéines, résistance au froid hivernal	1 – 2 fois à 5 l/ha	À partir du stade 3 feuilles
Prairies	Favorise le développement initial (au printemps), efficacité de l'azote, résistance au froid hivernal	2 – 5 fois à 5 – 10 l/ha	Pendant la période de végétation
Pommes de terre	Formation des tubercules, qualité des tubercules et de la peau, croissance des tubercules, calibrage	2 – 4 fois à 5 – 10 l/ha	Au grossissement des stolons
Légumineuses	Formation de nodules, qualité, teneur en protéines	1 – 2 fois 5 l/ha	A partir du stade 6 feuilles
Maïs	Favorise le développement juvénile (surtout en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, vitalité	1 – 2 fois à 5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Colza d'hiver / de printemps	Favorise le développement juvénile (surtout en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, vitalité, teneur en huile	1 – 2 fois à 5 – 10 l/ha	À partir du stade 4 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléfon: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Tournesol	Favorise le développement juvénile (surtout en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, vitalité, teneur en huile	1 – 2 fois à 5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Betteraves sucrières	Favorise le développement juvénile (surtout en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, vitalité, teneur en huile	1 – 3 fois à 5 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Fraises	Vitalité, fermeté des fruits, stabilité au stockage et au transport	2 – 4 fois à 5 l/ha	À partir de la nouaison
Fruits à pépins	Couleur rouge du dessus, fermeté du fruit, stabilité au stockage et au transport	2 fois 10 l/ha	4 et 2 semaines avant la récolte
Fruits à noyau	Vitalité, fermeté des fruits, stabilité au stockage et au transport	2 – 4 fois à 5 – 10 l/ha	À partir de la nouaison
Petits fruits arbustifs	Vitalité, fermeté des fruits, stabilité au stockage et au transport	2 – 4 fois à 5 l/ha	À partir de la nouaison
Raisins de table	Vitalité, fermeté des fruits, stabilité au stockage et au transport	2 – 4 fois à 5 – 10 l/ha	À partir de la nouaison
Agrumes	Vitalité, fermeté des fruits, stabilité au stockage et au transport	2 – 4 fois à 5 – 10 l/ha	À partir de la nouaison
Fruits à coque	Vitalité, fermeté des fruits, stabilité au stockage et au transport	2 – 4 fois à 5 l/ha	À partir de la nouaison
Raisins de cuve	Vitalité, fermeté des fruits, stabilité au stockage et au transport	2 – 4 fois à 5 – 10 l/ha	À partir de la nouaison
Légumes en général	Favorise le développement juvénile (surtout en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, vitalité, teneur en huile	2 – 4 fois à 5 – 10 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Plantes médicinales, aromatiques et condimentaires	Favorise le développement juvénile (surtout en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, vitalité, qualité interne	2 – 4 fois à 5 – 10 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Houblon	Favorise le développement juvénile (surtout en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, qualité interne	2 – 4 fois à 5 – 10 l/ha	À partir d'une hauteur de végétation de 0,5 m
Tabac	Favorise le développement juvénile (surtout en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, qualité interne	1 – 2 fois à 5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Sapins de Noël	Efficacité de l'azote, vitalité	1 – 3 fois à 5 – 10 l/ha	À partir du débourrement
Greens (gazons de golf)	Favorise le développement juvénile (surtout en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, qualité interne	2 – 5 fois à 5 – 10 l/ha	Pendant la période de végétation
Coton	Favorise le développement juvénile (surtout en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, qualité interne	2 – 4 fois à 5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Riz	Qualité du grain, teneur en protéines, résistance au froid hivernal	1 – 2 fois à 5 l/ha	À partir du stade 3 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléfon: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition

