



Informations sur le produit



Lebosol®-MagSOFT SC

Engrais minéral liquide composé
Engrais Mg-S en suspension (+24, +16)

24,1 % Oxyde de magnésium total (350 g/l MgO)
16,6 % Soufre total (240 g/l S)

**Les cultures présentant une carence en nutriments seront plus sensibles aux maladies et au stress abiotique.
La fertilisation foliaire avec des macro-et micro-éléments assurera une nutrition optimisée des plantes.**

Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Toutes cultures	Pour la nutrition en magnésium et soufre, le transport du phosphore, le rendement, la robustesse, l'efficacité N, la qualité du feuillage, le taux de photosynthèse	3 – 5 l/ha (pulvérisation foliaire dans au moins 200 l d'eau. Avec pulvérisateur dorsal : 0,5 %) Ne pas utiliser pendant la floraison !	Selon les besoins
Céréales	Qualité du grain, teneur en protéines, efficacité de l'azote, augmentation de la tolérance au stress, résistance au froid hivernal	1 – 3 fois 3 – 5 l/ha	À partir du stade 3 feuilles
Pâturage	Efficacité azotée, augmentation de la tolérance au stress, teneur énergétique, résistance à l'hiver	1 – 3 fois 3 – 5 l/ha	Pendant la période de végétation
Pommes de terre	Efficacité N, augmentation de la tolérance au stress, qualité de la peau	1 – 3 fois 3 – 5 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Légumes	Teneur en protéines, efficacité azotée, augmentation de la tolérance au stress	1 – 2 fois 3 – 5 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Pain	Qualité des grains, teneur énergétique, efficacité azotée, augmentation de la tolérance au stress	1 – 2 fois 3 – 5 l/ha	From 4-leaf stage
Colza oléagineux	Efficacité nutritionnelle, augmentation de la tolérance au stress, teneur en huile, résistance à l'hiver	1 – 3 fois 3 – 5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Tournesols	Efficacité nutritionnelle, augmentation de la tolérance au stress, teneur en huile	1 – 2 fois 3 – 5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France
Telefon: +33 484 896805
Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Betterave sucrière	Efficacité énergétique, augmentation de la tolérance au stress	1 – 3 fois 3 – 5 l/ha	From 6-leaf stage
Fraises	Efficacité azotée, qualité des feuilles, vitalité	2 – 4 fois 3 – 5 l/ha	À partir de bourgeons verts
Fruit à pépins	Qualité des feuilles, efficacité de l'azote, vitalité, prévention de la chute prématurée des feuilles	2 – 4 fois 3 – 5 l/ha	Bourgeons rouges
Fruit à noyau	Pour prévenir la chute prématurée des feuilles ; augmentation de la vitalité, de la qualité des feuilles et du taux de photosynthèse.	2 – 4 fois 3 – 5 l/ha	À partir de la nouaison
Fruits rouges	Pour prévenir la chute prématurée des feuilles ; augmentation de la vitalité, de la qualité des feuilles et du taux de photosynthèse.	2 – 4 fois 3 – 5 l/ha	Début de la croissance des pousses
Raisins de table	Qualité des feuilles, efficacité de l'azote, vitalité, prévention du flétrissement des baies	2 – 5 fois 3 – 5 l/ha	De l'élargissement des inflorescences
Agrumes	Efficacité azotée, qualité foliaire, vitalité	2 – 4 fois 3 – 5 l/ha	À partir des bourgeons blancs
Raisins de cuve	Qualité foliaire, efficacité azotée, vitalité, prévention du flétrissement des baies	2 – 5 fois 3 – 5 l/ha	À partir du grossissement des inflorescences
Plantes médicinales, aromatiques et épicées	Qualité foliaire, efficacité azotée, augmentation de la tolérance au stress, qualité interne	2 – 3 fois 3 – 5 l/ha	Une fois que la masse foliaire est suffisamment développée
Légumes en général	Qualité foliaire, efficacité azotée, augmentation de la tolérance au stress, qualité interne	2 – 4 fois 3 – 5 l/ha	Une fois qu'une masse foliaire suffisante s'est développée
Houblon	Qualité des feuilles, efficacité de l'azote, augmentation de la tolérance au stress	2 – 3 fois 3 – 5 l/ha	À partir d'une hauteur de croissance de 0,5 m
Tabac	Qualité des feuilles, efficacité de l'azote, augmentation de la tolérance au stress	1 – 3 fois 3 – 5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Sapins de Noël	Qualité des feuilles, efficacité de l'azote, vitalité, prévention de la chute prématurée des aiguilles	2 – 3 fois 3 – 5 l/ha	À partir du bourgeonnement
Plantes ornementales	Qualité des feuilles, efficacité de l'azote, augmentation de la tolérance au stress	2 – 3 fois 1 l (pour 100 l d'eau de pulvérisation, 3 – 5 l/ha)	Lorsque nécessaire
Légumes verts	Qualité des feuilles, efficacité de l'azote, augmentation de la tolérance au stress, résistance à l'hiver	2 – 4 fois 3 – 5 l/ha	Pendant la période de végétation
Noix	Efficacité de l'azote, qualité des feuilles, vitalité	2 – 4 fois 3 – 5 l/ha	À partir de la nouaison
Coton	Qualité des feuilles, efficacité de l'azote, augmentation de la tolérance au stress	1 – 3 fois 3 – 5 l/ha	À partir du bourgeonnement
Riz	Qualité des grains, efficacité de l'azote, augmentation de la tolérance au stress	1 – 3 fois 3 – 5 l/ha	À partir du stade 3 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition

