



Informations
sur le produit



Lebosol® - Nitrate de manganèse 235

Engrais minéral simple à oligo-élément
Engrais à oligo-éléments en suspension

15 % de manganèse sous forme de nitrate soluble dans l'eau (235 g/l Mn)

Contient également : 7,7 % d'azote total sous forme nitrique (120 g/l N)

**Les cultures présentant une carence en nutriments seront plus sensibles aux maladies et au stress abiotique.
La fertilisation foliaire avec des macro-et micro-éléments assurera une nutrition optimisée des plantes.**

Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Toutes cultures	Pour l'apport de manganèse, la qualité du feuillage, le rendement, l'équilibre hydrique, le taux de photosynthèse, la réduction du stress lumineux (antioxydant).	Applications répétées de 1 – 2 l/ha (dans au moins 200 l d'eau. Avec pulvérisateur dorsal : 0,25 %). Ne pas utiliser pendant la floraison !	En cas de besoin
Céréales	Efficacité N, vitalité, tallage, stabilité des tiges, résistance au froid hivernal	2 – 4 fois 1 – 2 l/ha	À partir du stade 3 feuilles
Prairies	Efficacité N, vitalité, tallage, stabilité des tiges, résistance au froid hivernal	2 – 5 fois 1 l/ha	Pendant la période de végétation
Pommes de terre	Efficacité N, vitalité, développement rapide en début de cycle, qualité de la peau	1 l/ha	En traitement des plants
Pommes de terre	Efficacité N, vitalité, qualité de la peau	2 – 4 fois 2 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Légumineuses	Efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid), teneur en protéines	1 – 3 fois 1 – 2 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Maïs	Efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid)	1 – 2 fois 1 – 2 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Colza	Efficacité N, vitalité, rendement en huile, résistance hivernale	2 – 3 fois 1 – 2 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Tournesol	Efficacité N, vitalité, rendement en huile	1 – 2 fois 1 – 2 l/ha	À partir du stade 4 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Betterave sucrière	Efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid)	1 – 3 fois 1 – 2 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Fraises	Efficacité N, vitalité, résistance hivernale	2 – 4 fois 1 l/ha	À partir des bourgeons verts
Fruits à pépins	Efficacité N, vitalité, coloration des fruits	2 – 4 fois 1 l/ha	Bourgeons rouges
Fruits à noyau	Efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid)	2 – 3 fois 1 l/ha	À partir de la nouaison
Petits fruits	Efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid)	2 – 3 fois 1 l/ha	Début de la croissance des pousses
Raisins de table	Efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid)	2 – 3 fois 1 l/ha	Inflorescences visibles
Raisins à vin	Efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid)	2 – 3 fois 1 l/ha	Inflorescences visibles
Plantes médicinales, aromatiques et épices	Qualité du feuillage, efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid), rendement en huile	2 – 4 fois 1 – 2 l/ha	Dès que la masse foliaire est suffisante
Légumes	Efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid)	2 – 4 fois 1 l/ha	Dès que la masse foliaire est suffisante
Houblon	Efficacité N, vitalité, résistance hivernale	1 – 4 fois 1 – 2 l/ha	À partir de 0,5 m de hauteur de végétation
Tabac	Efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid)	1 – 3 fois 1 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Sapins de Noël	Efficacité N, vitalité, qualité des aiguilles, résistance hivernale	2 – 3 fois 1 l/ha	À partir du débourrement
Plantes ornementales	Qualité du feuillage, vitalité	2 fois 1 l/ha	Dès que la masse foliaire est suffisante
Cultures de légumes-feuilles	Efficacité N, vitalité, tallage, stabilité des tiges, résistance au froid hivernal	2 – 5 fois 1 – 2 l/ha	Pendant la période de végétation
Fruits à coque	Efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid), qualité de la peau	2 – 5 fois 2 l/ha	À partir de la nouaison
Coton	Efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid), résistance hivernale	2 – 3 fois 1 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Riz	Efficacité N, vitalité, tallage, stabilité des tiges	1 – 3 fois 1 – 2 l/ha	À partir du stade 3 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition

