



Informations sur le produit



Phytoamine®

Engrais organique K, liquide
à base des substances végétales d'algues (*Ascophyllum nodosum*)

3,3 % d'oxyde de potassium total (36 g/l K₂O)
Matière de base: extrait d'algues marines (*Ascophyllum nodosum*)

Contient également : 0,36 % de soufre hydrosoluble (4 g/l S)
8,2 % substances organiques
0,12 % azote total (1 g/l N)
1,2-benzisothiazole-3(2H)-on pour la conservation <0,5%, en utilisant des conservateurs

**Les cultures présentant une carence en nutriments seront plus sensibles aux maladies et au stress abiotique.
La fertilisation foliaire avec des macro-et micro-éléments assurera une nutrition optimisée des plantes.**

Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Toutes les cultures	Renforcement général, promotion des processus métaboliques, renforcement des défenses et de la résilience	2 – 5 l/ha (Pour application foliaire. Lors de l'application avec un pulvérisateur à dos 0,3 – 0,5 %)	Si nécessaire
Toutes les cultures	Traitement des semences	0,2 – 0,3 l/dt	Pour l'enrobage des semences
Toutes les cultures	Renforcement général, stimulation des processus métaboliques, amélioration de la tolérance au stress, rendement, développement racinaire, activité photosynthétique	Fertigation	Demandez conseil à votre conseiller
Pommes de terre	Vitalité, qualité du feuillage, qualité de la peau	2 – 3 fois 2 – 3 l/ha	À partir de 20 cm de hauteur de végétation
Fraises, fruits rouges, fruits à pépins, fruits à noyau	Renforcement des boutons floraux, rendement	2 – 3 fois 2 – 3 l/ha	Début de la floraison à la nouaison
Fruits à pépins	Feuillage, différenciation des bourgeons floraux, rendement	4 fois 3 – 5 l/ha	Pleine floraison, fin de floraison, peu après la floraison, stade noisette

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France
Telefon: +33 484 896805
Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Fruits à noyau	Qualité de floraison, nouaison	2 – 3 fois 2 – 3 l/ha	Du début de la floraison à la nouaison
Petits fruits	Qualité de floraison, nouaison	2 – 3 fois 2 – 3 l/ha	Du début de la floraison à la nouaison
Raisins de table	Qualité de floraison, nouaison	2 – 3 fois 2 – 3 l/ha	De l'allongement des inflorescences jusqu'à la fin de la floraison
Les agrumes	Qualité de floraison, nouaison	2 – 3 fois 2 – 3 l/ha	Début de la floraison à la nouaison
Raisins de cuve	Renforcement des boutons floraux, rendement	2 – 3 fois 2 – 3 l/ha	Élargissement des inflorescences jusqu'à la fin de la floraison
Fruits à coque	Qualité de floraison, nouaison	2 – 3 fois 2 – 3 l/ha	Du début de la floraison à la nouaison
Légumes généraux	Renforcement de la résistance aux maladies	2 – 4 fois 2 – 3 l/ha	Dès la levée ou le repiquage
Plantes médicinales, aromatiques et condimentaires	Vitalité, qualité du feuillage, qualité de floraison, nouaison	2 – 4 fois 2 – 3 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Sapins de Noël	Amélioration du développement initial	1 – 3 fois 2 – 3 l/ha	À partir du débourrement
Plantes ornementales	Qualité du feuillage et de la floraison, croissance	2 – 4 fois 100 – 200 ml (pour 100 l d'eau de pulvérisation, 2 – 4 l/ha)	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Coton	Vitalité, qualité du feuillage, qualité de floraison, nouaison	2 – 4 fois 2 – 3 l/ha	Du début de la floraison à la nouaison

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition

