



Informations sur le produit



Lebosol®-Potassium 450

Engrais inorganique liquide composé avec macroéléments
Engrais NK 3-30, en solution

3 % Azote total sous forme d'azote uréique (45 g/l N)
30 % Oxyde de potassium, soluble dans l'eau (450 g/l K₂O)

**Les cultures présentant une carence en nutriments seront plus sensibles aux maladies et au stress abiotique.
La fertilisation foliaire avec des macro-et micro-éléments assurera une nutrition optimisée des plantes.**

Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Toutes les cultures	Pour la nutrition potassique, la qualité des feuilles, le rendement, l'équilibre hydrique, le taux de photosynthèse, l'augmentation de la tolérance au stress (au froid et à la chaleur), l'efficacité du N	5 – 10 l/ha (comme fertilisation foliaire dans 300 l d'eau. Lors de l'application avec un pulvérisateur à dos 2%.)	Si nécessaire
Toutes les cultures	Pour la nutrition potassique, la qualité des feuilles, le rendement, l'équilibre hydrique, le taux de photosynthèse, l'augmentation de la tolérance au stress (au froid et à la chaleur), l'efficacité du N	Fertigation	Demandez conseil à votre conseiller
Céréales	Teneur en protéines, tolérance au stress, résistance à l'hiver	2 à 3 fois 5 – 10 l/ha	A partir du stade 3 feuilles
Prairies	Favorise le développement initial (au printemps), efficacité de l'azote, résistance au froid hivernal	2 – 5 fois 5 – 10 l/ha	Pendant la période de végétation
Pommes de terre	Formation des tubercules, qualité des tubercules et de la peau, croissance des tubercules, calibrage	2 – 4 fois 6 – 10 l/ha	Au grossissement des stolons
Légumineuses	Formation des nodosités, qualité, teneur en protéines	1 – 2 fois 6 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Maïs	Favorise le développement juvénile (en particulier en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, vitalité	1 – 2 fois 6 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Colza	Favorise le développement juvénile (en particulier en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, vitalité, teneur en huile	1 – 2 fois 5 – 10 l/ha	À partir du stade 4 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France
Telefon: +33 484 896805
Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Tournesol	Favorise le développement juvénile (en particulier en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, vitalité, teneur en huile	1 – 2 fois 6 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Betteraves sucrières	Favorise le développement juvénile (en particulier en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, vitalité, formation du sucre	1 – 3 fois 6 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Fraises	Vitalité, fermeté des fruits, stabilité au stockage et au transport	2 – 4 fois 6 – 8 l/ha	À partir de la nouaison
Fruits à pépins	Coloration rouge de couverture, fermeté des fruits, stabilité au stockage et au transport	2 – 4 fois 6 – 8 l/ha	4 et 2 semaines avant la récolte
Fruits à noyaux	La fermeté et la taille des fruits, l'augmentation, la vitalité (par exemple dans des conditions froides), la robustesse hivernale	2 à 4 fois 5 l/ha	De la nouaison
Petits fruits	Coloration rouge de couverture, fermeté des fruits, stabilité au stockage et au transport	2 – 4 fois 6 – 8 l/ha	À partir de la nouaison
Raisins de table	Vitalité, fermeté de la pellicule des baies, stabilité au stockage et au transport	2 – 4 fois 6 – 8 l/ha	À partir de la nouaison
Agrumes	Réduction de la sensibilité aux taches bleues/noires, vitalité, tolérance au stress	2 à 4 fois 5 l/ha	De la nouaison
Vignes	Formation du sucre, maturation du bois, qualité, résistance à l'hiver	2 à 3 fois 5 – 10 l/ha	De la taille des pois
Plantes médicinales, aromatiques et condimentaires	Favorise le développement juvénile (en particulier en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, vitalité, qualité interne, qualité du feuillage	2 – 4 fois 5 – 10 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Légumes en général	Favorise le développement juvénile (en particulier en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, vitalité, qualité interne, qualité du feuillage	2 – 4 fois 5 – 10 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Houblon	Favorise le développement juvénile (en particulier en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, qualité interne	2 – 4 fois 5 – 10 l/ha	À partir de 0,5 m de hauteur de végétation
Tabac	Favorise le développement juvénile (en particulier en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, qualité interne	1 – 2 fois 6 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Sapins de Noël	Efficacité de l'azote, vitalité	1 – 3 fois 5 – 10 l/ha	À partir du débourrement
Plantes ornementales	Favorise le développement juvénile (en particulier en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, qualité du feuillage	1 – 3 fois 5 l/ha	Selon les besoins
Greens	Favorise le développement juvénile (en particulier en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, vitalité	2 – 5 fois 5 – 10 l/ha	Pendant la période de végétation
Fruits à coque	Coloration rouge de couverture, fermeté des fruits, stabilité au stockage et au transport	2 – 4 fois 6 – 8 l/ha	À partir de la nouaison
Coton	Favorise le développement juvénile (en particulier en conditions froides et humides), efficacité de l'azote, stabilité des fibres, résistance au froid hivernal	2 – 4 fois 6 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Riz	Teneur en protéines et qualité du grain, efficacité de l'azote	1 – 2 fois 6 l/ha	À partir du stade 3 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition

