



Informations
sur le produit

Lebosol®-QuadroMaxS SC

Engrais inorganique liquide simple avec macroélément
Engrais S (+19) avec oligo-éléments, en suspension

19,4 % de Soufre total (305 g/l S)

5,1 % de cuivre total sous forme d'oxychlorure de cuivre (80 g/l Cu)

8 % de manganèse total sous forme de carbonate (125 g/l Mn)

6,4 % de zinc total, sous forme d'oxyde (100 g/l Zn)

**Les cultures présentant une carence en nutriments seront plus sensibles aux maladies et au stress abiotique.
La fertilisation foliaire avec des macro-et micro-éléments assurera une nutrition optimisée des plantes.**

Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Toutes les cultures	Pour la nutrition en manganèse, cuivre et zinc, la qualité des feuilles, le rendement, l'équilibre hydrique, le taux de photosynthèse, la réduction du stress radiatif (antioxydant)	1,5 – 3 l/ha (comme fertilisation foliaire dans au moins 200 l d'eau. Lors de l'application avec un pulvérisateur à dos 0,2 %.)	Si nécessaire
Toutes les cultures	Enrobage des semences avec des nutriments pour favoriser le développement juvénile	0,2 – 0,4 l/dt	En traitement de semences
Céréales	Rendement, efficacité de l'azote, activité photosynthétique, résistance au froid hivernal	1 – 3 fois 1,5 – 3 l/ha	À partir du stade 3 feuilles
Prairies	Efficacité de l'azote, vitalité, tallage, stabilité des tiges, résistance au froid hivernal	2 – 5 fois 2 l/ha	Pendant la période de végétation
Pommes de terre	Efficacité de l'azote, vitalité, qualité de la peau	2 – 4 fois 2 – 3 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Légumineuses	Efficacité de l'azote, amélioration de la vitalité (p. ex. en conditions froides), teneur en protéines	1 – 2 fois 1,5 – 3 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Maïs	Efficacité de l'azote, amélioration de la vitalité (p. ex. en conditions froides)	1 – 2 fois 1,5 – 3 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Colza	Efficacité de l'azote, vitalité, rendement en huile, résistance au froid hivernal	2 – 3 fois 2 – 3 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Tournesol	Efficacité de l'azote, vitalité, rendement en huile	1 – 2 fois 1,5 – 3 l/ha	À partir du stade 4 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Betteraves sucrières	Efficacité de l'azote, amélioration de la vitalité (p. ex. en conditions froides)	1 – 3 fois 2 – 3 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Fraises	Efficacité de l'azote, amélioration de la vitalité (p. ex. en conditions froides)	2 – 4 fois 2 l/ha	À partir des boutons verts
Fruits à pépins	N efficacité, vitalité, coloration des fruits	2 – 4 fois 2 l/ha	Bourgeon rouge jusqu'à la récolte
Fruits à noyau	Efficacité de N, vitalité accrue (par exemple dans des conditions froides)	2 – 3 fois 2 l/ha	De la nouaison
Petits fruits	Efficacité de l'azote, amélioration de la vitalité (p. ex. en conditions froides)	2 – 3 fois 2 l/ha	Début de la croissance des pousses
Raisins de table	Efficacité de l'azote, amélioration de la vitalité (p. ex. en conditions froides)	2 – 3 fois 2 l/ha	Inflorescences visibles
Agrumes	Efficacité de N, vitalité accrue (par exemple dans des conditions froides)	2 – 3 fois 2 l/ha	Du bourgeon blanc à la récolte
Vignes	Efficacité de N, vitalité accrue (par exemple dans des conditions froides)	2 – 3 fois 2 l/ha	Inflorescences visibles
Plantes médicinales, aromatiques et condimentaires	Qualité du feuillage, efficacité de l'azote, amélioration de la vitalité (p. ex. en conditions froides), rendement en huile	2 – 4 fois 2 – 3 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Légumes en général	Efficacité de l'azote, amélioration de la vitalité (p. ex. en conditions froides)	2 – 4 fois 2 – 3 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Houblon	Efficacité de l'azote, vitalité	2 – 4 fois 2 l/ha	À partir de 0,5 m de hauteur de végétation
Tabac	Efficacité de l'azote, vitalité	1 – 3 fois 2 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Sapins de Noël	Efficacité de l'azote, vitalité, résistance au froid hivernal	1 – 3 fois 2 l/ha	À partir du débournement
Plantes ornementales	Qualité du feuillage, vitalité	2 fois 1 – 2 l/ha	Selon les besoins
Greens	Efficacité de l'azote, vitalité, tallage, stabilité des tiges, résistance au froid hivernal	2 – 5 fois 2 l/ha	Pendant la période de végétation
Fruits à coque	Efficacité de l'azote, amélioration de la vitalité (p. ex. en conditions froides), qualité de la coque	2 – 5 fois 2 l/ha	À partir du gonflement des bourgeons
Coton	Efficacité de l'azote, amélioration de la vitalité (p. ex. en conditions froides), résistance au froid hivernal	2 – 3 fois 2 – 3 l/ha	À partir de la nouaison
Riz	Efficacité de l'azote, vitalité, tallage, stabilité des tiges	2 – 3 fois 1,5 – 3 l/ha	À partir du stade 3 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition

