



Informations
sur le produit



Lebosol®-Robustus SC

Engrais inorganique liquide simple avec macroélément
Engrais, N-(Ca Mg) 1,8 (+14,6 +1,7) avec oligo-éléments en suspension

1,8 % Azote total sous forme d'azote uréique (25 g/l N)
14,6 % Oxyde de calcium total (215 g/l CaO)
1,7 % Oxyde de magnésium total (25 g/l MgO)
7 % Bore total sous forme de borate de calcium (100 g/l B)

**Les cultures présentant une carence en nutriments seront plus sensibles aux maladies et au stress abiotique.
La fertilisation foliaire avec des macro-et micro-éléments assurera une nutrition optimisée des plantes.**

Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Dans toutes les cultures	Pour la nutrition du bore, le transport du calcium, la qualité du pollen, le rendement, la qualité de la floraison, la qualité des fruits, le taux de photosynthèse	0,75 – 3 l/ha (comme fertilisation foliaire dans 200 – 400 l d'eau. Lors de l'application avec le pulvérisateur à dos 0,5 %)	Si nécessaire
Toutes les cultures	Amélioration de la vitalité (p. ex. en cas de gel pendant la floraison)	1 – 2 fois 2 l/ha (meilleur effet en combinaison avec 2 l/ha Aminosol® + 5 l/ha Lebosol®-Potassium 450)	Selon les besoins
Céréales	Efficacité de l'azote, stabilité des tiges, qualité des semences, résistance au froid hivernal	1 – 2 fois 0,75 – 1,5 l/ha	À partir du stade 3 feuilles
Prairies	Efficacité de l'azote, vitalité, stabilité des tiges, résistance au froid hivernal	1 – 4 fois 1 – 2 l/ha	Pendant la période de végétation
Pommes de terre	Efficacité de l'azote, qualité interne, fermeté de la peau	1 – 4 fois 2 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Légumineuses	Nouaison, efficacité de l'azote, amélioration de la vitalité (p. ex. en conditions froides), teneur en protéines	2 fois 2 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Maïs	Densité énergétique, efficacité de l'azote, rendement, amélioration de la vitalité (p. ex. en conditions froides)	1 – 2 fois 2 l/ha	À partir du stade 4 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France
Telefon: +33 484 896805
Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Colza	Stabilité des tiges, fermeté des siliques, efficacité de l'azote, résistance au froid hivernal, maturation homogène, teneur en huile	2 – 4 fois 2 – 3 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Tournesol	Stabilité des tiges, fermeté des capitules, efficacité de l'azote, résistance au froid hivernal, maturation homogène, teneur en huile	1 – 2 fois 2 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Betteraves sucrières	Efficacité de l'azote, amélioration de la vitalité (p. ex. en conditions froides), prévention de la pourriture du cœur et de la pourriture sèche, teneur en sucre	2 – 4 fois 2 – 3 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Fraises	Qualité des plantes dans les cultures de multiplication : propagation, plants vigoureux	2 fois 2 l/ha	14 et 7 jours avant l'arrachage des jeunes plants
Fraises	Prévention des fruits déformés ; teneur en sucre, développement des bourgeons floraux, résistance au froid hivernal	1 – 3 fois 2 – 3 l/ha	À partir des boutons verts
Fruits à pépins	Mise à fruit, qualité de la peau, développement des bourgeons floraux, résistance à l'hiver	2 – 4 fois 1 – 2 l/ha	Bourgeons rouges
Fruit à noyau	Mise à fruit, qualité de la peau, développement des bourgeons floraux, résistance à l'hiver	2 – 3 fois 1 – 2 l/ha	De la nouaison
Petits fruits	Nouaison, qualité de l'épiderme, développement des bourgeons floraux, résistance au froid hivernal	1 – 3 fois 1 – 2 l/ha	Début de la croissance des pousses
Raisins de table	Nouaison, qualité de l'épiderme, développement des bourgeons floraux, résistance au froid hivernal, maturation homogène	2 – 3 fois 1 – 2 l/ha	À partir de l'allongement des inflorescences
Agrumes	Mise à fruit, qualité de la peau, développement des bourgeons floraux, résistance à l'hiver	2 – 4 fois 1 – 2 l/ha	Bourgeons blancs
Vignes	Mise à fruit, qualité de la peau, développement des boutons floraux, résistance à l'hiver, maturation régulière	2 – 3 fois 1 – 2 l/ha	De l'élargissement des inflorescences
Légumes-fruits	Floraison, nouaison	1 – 2 fois 2 l/ha	Avant la floraison avec une masse foliaire suffisante
Choux, légumes-feuilles, oignons	Contre la nécrose interne des choux, laitues, etc., qualité interne	2 – 3 fois 2 – 3 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Asperges	Qualité (fissures, tiges creuses, qualité de l'épiderme)	2 – 3 fois 2 – 3 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Légumes-racines et légumes-tubercules	Qualité (fissures, cavités internes, brunissement interne)	2 – 3 fois 2 – 3 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Légumes en général	Qualité du feuillage, stabilité des tiges, efficacité de l'azote, vitalité (p. ex. par temps froid), maturation homogène, teneur en huile	2 – 4 fois 2 – 3 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Plantes médicinales, aromatiques et condimentaires	Qualité du feuillage, stabilité des tiges, efficacité de l'azote, vitalité (p. ex. par temps froid), maturation homogène, teneur en huile	2 – 4 fois 1 – 3 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Houblon	Développement des bourgeons et des pousses, qualité	3 – 5 fois 1 – 2 l/ha	À partir de 0,5 m de hauteur de végétation
Tabac	Efficacité de l'azote, vitalité, qualité du feuillage	1 – 3 fois 1 – 2 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Sapins de Noël	Qualité des aiguilles, efficacité de l'azote, vitalité, résistance au froid hivernal	1 – 2 fois 1 – 2 l/ha	À partir du débourrement

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition

