



MADE IN
GERMANY

Lebosol 

**Informations
sur le produit**

VITALoSol® GOLD SC

Engrais inorganique liquide simple à macroélément
Engrais en suspension avec oligo-éléments, S (+36)

36 % Soufre élémentaire (570 g/l S)

2,4 % Cuivre total sous forme d'oxychlorure de cuivre (40 g/l Cu)

9,6 % Manganèse total sous forme de carbonate de manganèse (150 g/l Mn)

**Les cultures présentant une carence en nutriments seront plus sensibles aux maladies et au stress abiotique.
La fertilisation foliaire avec des macro-et micro-éléments assurera une nutrition optimisée des plantes.**

Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Toutes cultures	Apport nutritif, efficacité N, rendement et teneur en protéines, amélioration de la tolérance au stress	2 – 5 l/ha (pulvérisation foliaire dans au moins 200 l d'eau)	En cas de besoin
Toutes cultures	Traitement des semences	0,1 – 0,3 l/dt	Pour l'enrobage des semences
Céréales	Apport nutritif, teneur en protéines, résistance hivernale, renforcement de la tolérance au stress	1 – 3 fois 2 – 5 l/ha	À partir du stade 3 feuilles
Prairies	Qualité du feuillage, efficacité N, taux de photosynthèse, résistance hivernale, teneur énergétique	2 – 5 fois 2 – 4 l/ha	Pendant la période de végétation
Pommes de terre	Qualité du feuillage, efficacité N, qualité de la peau, amélioration de la tolérance au stress	3 – 5 fois 2 – 5 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Légumineuses	Qualité du feuillage, efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid), teneur en protéines, amélioration de la tolérance au stress	1 – 2 fois 2 – 5 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Maïs	Efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid), teneur en protéines, amélioration de la tolérance au stress	1 – 2 fois 2 – 5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Colza	Efficacité N, teneur en huile, qualité du feuillage, résistance hivernale, amélioration de la tolérance au stress	2 – 3 fois 3 – 5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Tournesol	Efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid), teneur en huile, renforcement de la résistance au stress	1 – 2 fois 2 – 5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléfon: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Betterave sucrière	Efficacité N, stimulation des défenses naturelles, revitalisation	2 – 3 fois 3 – 5 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Fraises	Revitalisation, taux de photosynthèse	2 – 4 fois 2 – 5 l/ha	À partir de la nouaison
Fruits à pépins	Revitalisation, taux de photosynthèse	2 – 4 fois 2 – 5 l/ha	À partir de la fin de floraison (seulement à partir du stade noix pour les variétés sensibles au russeting)
Fruits à noyau	Revitalisation, taux de photosynthèse	2 – 4 fois 2 – 5 l/ha	À partir de la nouaison
Petits fruits	Revitalisation, taux de photosynthèse	2 – 4 fois 2 – 5 l/ha	À partir de la nouaison
Raisins de table	Revitalisation, taux de photosynthèse	2 – 4 fois 2 – 5 l/ha	Inflorescences visibles
Agrumes	Revitalisation, taux de photosynthèse	2 – 4 fois 2 – 5 l/ha	À partir de la nouaison
Raisins à vin	Revitalisation, taux de photosynthèse	2 – 4 fois 3 – 5 l/ha	Inflorescences visibles
Plantes médicinales, aromatiques et épices	Efficacité N, vitalité accrue (p. ex. par temps froid), teneur en huile ou en principes actifs, amélioration de la tolérance au stress	2 – 4 fois 3 – 5 l/ha	Dès que la masse foliaire est suffisante
Légumes	Efficacité N, qualité du feuillage, vitalité accrue (p. ex. par temps froid), renforcement de la résistance au stress	2 – 4 fois 3 – 5 l/ha	Dès que la masse foliaire est suffisante
Houblon	Efficacité N, revitalisation, résistance hivernale, stimulation des défenses naturelles	2 – 4 fois 3 – 5 l/ha	À partir de 0,5 m de hauteur
Tabac	Efficacité N, stimulation des défenses naturelles, revitalisation	1 – 3 fois 3 – 5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Sapins de Noël	Qualité des aiguilles, taux de photosynthèse	2 – 3 fois 2 – 4 l/ha	À partir du débourrement
Cultures de légumes-feuilles	Qualité du feuillage, efficacité N, taux de photosynthèse, résistance hivernale	2 – 5 fois 2 – 4 l/ha	Pendant la période de végétation
Fruits à coque	Revitalisation, taux de photosynthèse	2 – 4 fois 3 – 5 l/ha	À partir de la nouaison
Coton	Efficacité N, revitalisation, résistance hivernale, stimulation des défenses naturelles	2 – 4 fois 3 – 5 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Riz	Qualité du grain, efficacité N, vitalité accrue, amélioration de la tolérance au stress	1 – 3 fois 2 – 5 l/ha	À partir du stade 3 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition

