



Informations
sur le produit

BIO

MADE IN
GERMANY

Lebosol®-Zinc 700 SC

Engrais inorganique simple avec oligo-élément
Engrais à oligo-élément en Suspension

40 % De zinc total sous forme d'oxyde de zinc (700 g/l Zn)

**Les cultures présentant une carence en nutriments seront plus sensibles aux maladies et au stress abiotique.
La fertilisation foliaire avec des macro-et micro-éléments assurera une nutrition optimisée des plantes.**

Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Toutes cultures	Pour la nutrition en zinc, l'équilibre des phytohormones, la qualité de la floraison, la fertilisation, le rendement, l'équilibre énergétique, le taux de photosynthèse, la réduction du stress radiatif (antioxydant)	Nombreuses applications de 0,25 à 2 l/ha (dans au moins 200 l d'eau. Lors de l'application avec un pulvérisateur à dos 0,25 %.)	Si nécessaire
Toutes cultures	Traitement des semences et des plants avec des nutriments pour un meilleur développement juvénile et une meilleure vitalité	0,05 – 0,2 l/dt	Pour le traitement des semences et des plants
Céréales d'hiver/de printemps	Efficacité de l'azote, qualité de la floraison, fécondation, tolérance au stress, vitalité	1 – 3 fois 0,5 – 1 l/ha	À partir du stade 3 feuilles
Prairies	Efficacité de l'azote, vitalité, tolérance au stress	2 – 5 fois 0,5 – 1 l/ha	Pendant la période de végétation
Pommes de terre	Efficacité de l'azote, développement juvénile rapide, qualité de la peau, tolérance au stress	2 – 4 fois 0,5 – 1 l/ha	À partir du début de la fermeture des rangs
Légumineuses	Efficacité de l'azote, qualité de la floraison, fécondation, tolérance au stress, vitalité	2 – 3 fois 0,5 – 1 l/ha	À partir du stade 6 feuilles
Maïs	Efficacité de l'azote, qualité de la floraison, fécondation, tolérance au stress, vitalité	1 – 2 fois 0,5 – 1 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Colza d'hiver/de printemps	Efficacité de l'azote, qualité de la floraison, fécondation, tolérance au stress, vitalité	2 – 3 fois 0,5 – 1 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Tournesols	Efficacité de l'azote, qualité de la floraison, fécondation, tolérance au stress, vitalité	1 – 2 fois 0,5 – 1 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Betteraves sucrières	Efficacité de l'azote, vitalité, tolérance au stress	1 – 3 fois 0,5 – 1 l/ha	À partir du stade 6 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléfon: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition



Culture	Objectif	Recommandation	Stade d'application
Fraises	Efficacité en N, qualité de floraison, ferti- sation, tolérance au stress, vitalité	2 – 4 fois 0,5 – 2 l/ha	Bourgeons verts
Fruits à pépins	Qualité de floraison, transport du calci- um, vitamine, photosynthèse, nouaison, qualité du fruit	2 – 4 fois 0,25 – 1 l/ha	Bourgeons rouges
Fruits à noyau	Qualité de la floraison, transport du calci- um, formation de vitamines, nouaison, qualité des fruits	2 – 4 fois 0,25 – 1 l/ha	À partir de la nou- aison
Baies arbustives	Qualité de la floraison, transport du calci- um, formation de vitamines, nouaison, qualité des fruits	2 – 4 fois 0,25 – 1 l/ha	Début de la crois- sance des pousses
Raisins de table	Qualité de la floraison, transport du calci- um, nouaison, qualité des fruits, maturation homogène	2 – 4 fois 0,25 – 1 l/ha	À partir du stade grappes visibles
Agrumes	Qualité de floraison, transport du calcium, vitamine, photosynthèse, nouaison, qualité du fruit	2 – 4 fois 0,25 – 1 l/ha	Du bourgeon blanc à la récolte
Fruits à coque	Qualité de la floraison, transport du calci- um, formation de vitamines, nouaison, qualité des fruits	2 – 5 fois 0,25 – 1 l/ha	À partir du gon- flement des bour- geons
Vignes	Qualité de floraison, transport du calcium, vitamine, photosynthèse, nouaison, qualité du fruit	2 – 4 fois 0,25 – 1 l/ha	Inflorescences visibles
Légumes en général	Efficacité de l'azote, qualité de la floraison, nouaison, qualité des fruits, transport du calcium, qualité interne, formation de vita- mines	2 – 4 fois 0,25 – 1 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Plantes médi- cinales, aroma- tiques et condi- mentaires	Efficacité de l'azote, qualité de la floraison, nouaison, qualité des fruits, transport du calcium, qualité interne	2 – 4 fois 0,25 – 1 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Houblon	Efficacité de l'azote, qualité de la floraison, nouaison	1 – 4 fois 0,5 – 1 l/ha	À partir de 0,5 m de hauteur de crois- sance
Tabac	Efficacité de l'azote, vitalité, tolérance au stress	1 – 3 fois 0,5 – 1 l/ha	À partir du stade 4 feuilles
Sapins de Noël	Efficacité de l'azote, vitalité, tolérance au stress	2 – 3 fois 0,5 – 1 l/ha	À partir du débour- rement
Plantes orne- mentales	Qualité du feuillage et de la floraison, effi- cacité de l'azote, tolérance au stress, vitalité	2 fois 0,5 l/ha	Dès qu'une masse foliaire suffisante est développée
Greens	Efficacité de l'azote, vitalité, tolérance au stress	2 – 5 fois 0,5–1 l/ha	Pendant la période de végétation
Coton	Qualité de la floraison, transport du calci- um, nouaison, qualité, résistance au froid	2 – 3 fois 0,5 – 1 l/ha	À partir du débour- rement
Riz	Efficacité de l'azote, qualité de la floraison, fécondation, tolérance au stress, vitalité	1 – 3 fois 0,5 – 1 l/ha	À partir du stade 3 feuilles

Lebosol® France

25 Boulevard des Dames • 13002 Marseille • France

Téléphone: +33 484 896805

Info@lebosol.fr • www.lebosol.de/fr

sustainable plant nutrition

