

Nos recommandations pour un apport optimal en nutriments chez les fraises :

Dans quel but ?	Quoi ?	Quand ?						
		Plantation	Débourrement	Bouton vert	Fin de floraison	Récolte	Après récolte	Arrachage des jeunes plants
✓ Promotion de l'enracinement ✓ Amélioration de l'efficacité et de la compatibilité des traitements phytosanitaires et des apports de calcium	Aminosol® 	7 – 10 jours après la plantation, arroser avec 5 – 10 l/ha.	150 – 300 ml pour 100 l de bouillie de pulvérisation lors des traitements phytosanitaires et des apports de calcium					
✓ Amélioration du transport de l'eau ✓ Qualité foliaire ✓ Correction de la chlorose ferrique	Lebosol®-HeptaFer 			2 – 6 fois 3 – 7 l/ha en application foliaire si nécessaire				
✓ Qualité des fruits ✓ Rendement ✓ Formation florale ✓ Conservation et résistance au transport	Lebosol®-Silicium + Phytoamine® 			2 – 4 fois 0,5 l/ha + 2 l/ha				
✓ Performance photosynthétique ✓ Qualité foliaire ✓ Vitalité	Lebosol®-MagSOFT SC		2 – 3 fois 3 – 5 l/ha					
✓ Qualité florale ✓ Nouaison ✓ Transport du calcium	Lebosol®-Zinc 700 SC + Lebosol®-Robustus SC 			2 – 3 fois 0,25 l/ha + 2 l/ha				
✓ Fermeté des fruits ✓ Conservation et résistance au transport	Lebosol®-Calcium-Forte SC			3 – 4 fois 4 – 6 l/ha				
✓ Qualité des plants de multiplication ✓ Accumulation de réserves	Aminosol® + Lebosol®-Zinc 700 SC + Lebosol®-Bore 						2 fois 2 l/ha + 0,5 l/ha + 1 l/ha	

Top 3 des produits Lebosol® les plus populaires pour la culture des fraises :



Lebosol®-Zinc 700 SC

Suspension d'engrais pour l'apport en zinc actif
Ingrédient :
 700 g/l Zn



Lebosol®-Silicium

Solution d'engrais à oligoéléments pour la stabilisation ciblée des cellules végétales
Ingrédients : 7 g/l Fe · 20 g/l Zn
Contient également : 20 g/l N · 610 g/l SiO₂



Lebosol®-HeptaFer

Solution d'engrais à base de fer complexé par l'acide heptagluconique
Ingrédient : 55 g/l Fe