

Nos recommandations pour un apport optimal en nutriments pour les fruits à noyau et les baies :



Dans quel but ?	Quoi ?	Quand ?						
		Débourrement	Formation des fleurs	Pleine floraison	Fin de floraison	Croissance des fruits	Développement du fruit à maturité	Post-récolte
✓ Qualité florale et nouaison ✓ Réduction du stress dû au rayonnement	Avitar® 				2 – 3 fois 3 – 5 l/ha			
✓ Nouaison et calibre des fruits ✓ Réduction de la rubéole ✓ Contre les symptômes de la sharka	Aminosol® 			3 fois 5 – 7,5 l/ha				2 fois 2 l/ha
✓ Plus de vitalité (p. ex. en cas de gel pendant la floraison)	Aminosol® + Lebosol®-Robustus SC + Lebosol®-Potassium 450		1 – 2 fois 2 l/ha + 2 l/ha + 5 l/ha					
✓ Transport de l'eau (réduction du stress thermique) ✓ Élimination de la chlorose ferrique	Lebosol®-HeptaFer 				2 – 4 fois 3 – 7 l/ha par voie foliaire			
		30 – 60 ml/arbre et 300 – 400 ml par 100 m de rang (au sol, par cuve)						
✓ Qualité des fruits ✓ Résistance à l'éclatement ✓ Conservation	Lebosol®-Silicium + Phytoamine®			2 – 4 fois 1 l/ha + 5 l/ha				
✓ Fermeté des fruits ✓ Conservation	Lebosol®-Calcium-Forte SC				2 – 5 fois 4 – 8 l/ha			

Top 3 des produits Lebosol® les plus populaires pour la culture des fruits à noyau et des baies :



Lebosol®-Zinc 700 SC
Suspension d'engrais pour l'apport en zinc actif
Ingrédient :
700 g/l Zn



Lebosol®-Silicium
Solution d'engrais à oligoéléments pour la stabilisation ciblée des cellules végétales
Ingrédients : 7 g/l Fe · 20 g/l Zn
Contient également : 20 g/l N · 610 g/l SiO₃



Lebosol®-HeptaFer
Solution d'engrais à base de fer complexé par l'acide heptagluconique
Ingrédient : 55 g/l Fe