



Информация о продукте

MADE IN GERMANY

Lebosol®-Калий-Плюс

Концентрат эмульсии | р 1,37 | рН 5,0

3% общего содержания азота - карбомидный азот 41 г/л (N) 27%
фосфита, растворимого в минеральной кислоте 370 г/л, P₂O₅ 18%
водорастворимый оксид калия 247 г/л (K₂O)

Культура	Цель	Рекомендации	Сроки
Для всех культур	Обеспечение калием, фосфором	1-4 л/га	Расход рабочей жидкости не менее 300 л/га. При использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего раствора 2%
Картофель	Повышение устойчивости к болезням	2-4 раза 1-3 л/га	Многочисленные обработки с 1-3 л к концу периода образования столонов
Земляника садовая	Повышение устойчивости к болезням, в т. ч. к возбудителям фитофториоза, вертициллезного увядания	3-4 раза 2-3 л/га	в фазе 1-2 листа Рядковое опрыскивание после посева и осенью; листовая подкормка весной перед цветением
	Повышение устойчивости к болезням	2-3 раза 1-4 л/га	с момента появления зеленых почек и до конца цветения
Семечковые плодовые	Повышение устойчивости к болезням	2-3 раза 2-4 л/га	фазы розового бутона до опадения завязи в июне
Ежевика/малина	Повышение устойчивости к болезням	2-3 раза 2-4 л/га	с начала образования отростков и до сбора урожая
Столовый виноград	Повышение устойчивости к болезням	2-3 раза 2-4 л/га	перед цветением и до достижения размера ягоды с горошину
Косточковые культуры	Повышение устойчивости к болезням	2-3 раза 2-4 л/га	с фазы розового бутона до опадения завязи в июне
Технический виноград	Повышение устойчивости к болезням	2-3 раза 2-4 л/га	перед цветением и до достижения размера ягоды с горошину
Плодовые овощные	Повышение устойчивости к болезням	2-3 раза 2-3 л/га	при необходимости
Капустные, зеленые и луковичные	Повышение устойчивости к болезням, урожайность	2-3 раза 2-3 л/га	при необходимости
Сельдерей	Повышение устойчивости к болезням	2-3 раза 2-3 л/га	при необходимости

