



Informații despre produs



Lebosol®-Amonium TS 200

Îngrășământ anorganic lichid cu macroelemente

N (S) îngrășământ în soluție 15 (+21)

15 % Azot total (200 g/l N) din care: 9,3 % Azot amoniacal (123 g/l N);

5,7 % Azot ureic (77 g/l N)

21,3 % Sulf solubil în apă (281 g/l S)

Culturile cu deficit de nutrienți vor fi mai sensibile la boli și stres abiotici.

Fertilizarea foliară cu macro și microelemente va asigura o nutriție optimă a plantelor.

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
La toate culturile	Pentru furnizarea de nutrienți (azot și sulf), vitalitate (ex: la frig), creșterea calității aparatului foliar, intensifică fotosinteza, contribuie la creșterea și îmbunătățirea indicatorilor de calitate (conținut de ulei, proteină, etc.), spor de producție	Mai multe aplicări cu 3 - 5 l/ha, în 200 - 400 l apă/ha; alte echipamente, 0,5 - 1% l, respectiv 0,25 - 0,5% la culturile sensibile din spațiile protejate (sere/solarii etc.). A nu se aplica în timpul înfloriturii!	în caz de necesitate
	Sursă de azot și sulf, aduce vigoare plantelor, productivitate, îmbunătățește calitatea aparatului foliar, intensifică fotosinteza	Prin fertirigare	în caz de necesitate
Cereale păioase	Creștere și dezvoltare vegetativă, influențează pozitiv calitatea producției, contribuie la creșterea și îmbunătățirea indicatorilor de calitate (conținutul de proteină, MMB-ul etc.), intensifică fotosinteza, disponibilitate mai bună a azotului pentru plantă	2 - 4 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze

Lebosol® România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Rapiță	Furnizarea de sulf-element esențial pentru rapiță, intensifică fotosinteza, dezvoltare vegetativă, crește disponibilitatea azotului în plantă, conținut de ulei	2 - 4 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze și până la începutul înfloritului și după scuturarea florilor, faza de silicve verzi
Porumb	Îmbunătățește vitalitate plantelor (ex: la frig), creșterea calității aparatului foliar, intensifică fotosinteza, stimulează dezvoltarea de știuleți și a numărului de boabe/știulete, spor de producție	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Floarea-soarelui	Randament pozitiv privind creșterea vegetativă, conferă vitalitate și vigurozitate plantei, crește conținutul de ulei, spor de producție	1 - 2 aplicări cu 3 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Cartof	Utilizarea eficientă a azotului (N), vitalitate (ex: la frig), intensifică fotosinteza, dezvoltare vegetativă, spor de producție	2 - 4 aplicări cu 5 l/ha	de la începutul închiderii rândurilor
Leguminoase	Utilizarea eficientă a azotului (N), vitalitate (ex: la frig), intensifică fotosinteza, conținut de proteină, producție	2-4 aplicări cu 2 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Sfeclă de zahăr	Creștere vegetativă, utilizare mai bună a azotului în plantă, vitalizare, ajută la formarea zaharurilor, spor de producție	2 - 4 aplicări cu 2 - 5 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Pășuni și plante furajere	Producție, eficientizarea utilizării azotului, vitalitate	2 - 4 aplicări cu 5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Varză, verdețuri și ceapă	Asigură o calitate mai bună și crește productivitatea	2 - 3 aplicări cu 5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Legume	Eficientizarea utilizării azotului, creștere vegetativă, crește calitatea legumelor	2 - 4 aplicări cu 5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Orez	O mai bună utilizare a azotului, creștere, vitalitate	2 - 4 aplicări cu 5 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Producție, îmbunătățește eficiența asimilării azotului în plantă, conținut de proteină, calitate	2 - 4 aplicări cu 5 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Hamei	Îmbunătățește eficiența asimilării azotului în plantă, vitalitate	2 - 4 aplicări cu 5 l/ha	0,5 m înălțime de creștere până la recoltare
Gazon și grădini	Îmbunătățește eficiența asimilării azotului în plantă, vitalitate	2 - 4 aplicări cu 5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Bumbac	Îmbunătățește eficiența asimilării azotului în plantă, vitalitate	2 - 4 aplicări cu 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze

Lebosol® România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition

