



Informații despre produs

MADE IN GERMANY

# Lebosol®-Fosfor-Plus

Îngrășământ anorganic lichid compus cu macroelemente  
Soluție de îngrășământ NPK cu microelemente, 3-33-2

3 % Azot (40 g/l N);  
33,5 % Fosfat solubil în apă (465 g/l P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>);  
2,2 % Oxid de potasiu solubil în apă (30 g/l K<sub>2</sub>O)

Suplimentar, conține:

0,37 % Mangan solubil în apă (5 g/l Mn);  
0,15 % Cupru solubil în apă (2 g/l Cu);  
0,72 % Zinc solubil în apă (10 g/l Zn);  
0,008% Molibden solubil în apă (1 g/l Mo).

**Culturile cu deficit de nutrienți vor fi mai sensibile la boli și stres abiotic.  
Fertilizarea foliară cu macro și microelemente va asigura o nutriție optimă a plantelor.**

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
La toate culturile	Pentru aprovizionarea cu fosfor, dezvoltarea inițială a tinerelor plante, dezvoltarea sistemului radicular, echilibru energetic, eficientizează utilizarea azotului în plantă, prevenirea/ combaterea blocajelor de fosfor	Mai multe treceri cu 3 - 10 l/ha (200 - 400 l apă/ha, respectiv în concentrație de 0,5 - 1%)	în caz de necesitate
	Pentru aprovizionarea cu fosfor, dezvoltarea inițială a tinerelor plante, dezvoltarea sistemului radicular, echilibru energetic, eficientizează utilizarea azotului în plantă, prevenirea/ combaterea blocajelor de fosfor	Prin fertirigare	Adresați-vă unui specialist!

**Lebosol® România S.R.L.**

Str. Strada nr. 2, nr. 24  
077010 – Afumați, jud. Ilfov  
Tel. +4021 310 69 03  
office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Cereale păioase	Furnizarea de fosfor, dezvoltare inițială a tinerelor plante, dezvoltare sistem radicular, influențează fluxul de energie din plantă	2 -3 aplicări cu 3-6 l/ha	în cazul aprovizionării slabe la sol, se recomandă: - toamna, în faza de 3 frunze; - primăvara devreme, la pornirea în vegetație
Rapiță	Aprovizionare cu fosfor, dezvoltarea sistemului radicular, influențează transportul de energie în plantă, contribuie la fortificarea țesuturilor, potențial ridicat de producție	2 - 3 aplicări 3 - 6/ha	În cazul aprovizionării slabe la sol, se recomandă: - toamna, în faza de 4 frunze; - primăvara devreme, la pornirea în vegetație
Porumb	Dezvoltare sistem radicular, vigurozitate ridicată, fortifică țesuturile plantei, echilibru energetic, stimulează dezvoltarea de știuleți și a numărului de boabe/știulete	2 aplicări cu 4 - 6 l/ha	în cazul aprovizionării slabe a solului sau a disponibilității slabe a fosforului de la sol; în stadiul de 4-6 frunze
Floarea-soarelui	Creșterea și dezvoltarea sistemului radicular, contribuie la fortificarea tulpinii, oferă stabilitate plantei	1 - 2 aplicări 4 - 6 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Leguminoase	Pentru aprovizionarea cu fosfor, dezvoltarea inițială a tinerelor plante, echilibru energetic, eficientizează utilizarea azotului în plantă	1 - 3 aplicări cu 3 – 6 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Cartof	Formarea și creșterea tuberculilor, crește conținutul de amidon, reduce sensibilitatea la vătămare/lovire, sporește fermitatea epidermei (cojii), oferă gust și crește perioada de păstrare	2 - 4 aplicări cu 3 - 6 l/ha	după apariția primilor lăstari și ulterior
Sfeclă pentru zahăr	Dezvoltarea inițială a tinerelor plante, vitalitate, calitatea aparatului foliar, spor de producție, intensitatea fotosintezei	2 - 4 aplicări cu 3 - 6 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Fructe semînțoase	Prevenirea/combateră blocajelor de fosfor, dezvoltarea sistemului radicular, echilibru energetic, influențează înfloritul, legarea fructelor, acumularea de zahăr în fructe	2 - 4 aplicări cu 3 - 6 l/ha	după fructificare și până la 4, respectiv 2 săptămâni înainte de recoltare
Fructe sâmburoase	Prevenirea/combateră blocajelor de fosfor, dezvoltarea sistemului radicular, echilibru energetic, influențează înfloritul, legarea fructelor, acumularea de zahăr în fructe	2 - 4 aplicări cu 3 - 6 l/ha	de la formarea fructelor

### Lebosol® România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Struguri de masă	Prevenirea/combaterăa blocajelor de fosfor, dezvoltarea sistemului radicular, echilibru energetic, influențează înfloritul, dezvoltarea ciorchinilor	2 - 4 aplicări cu 3 - 6 l/ha	începând cu faza de 3 frunze până la compactarea ciorchinilor și după înflorit
Struguri pentru vin	Prevenirea/combaterăa blocajelor de fosfor, dezvoltarea sistemului radicular, echilibru energetic, influențează înfloritul, dezvoltarea ciorchinilor	2 - 4 aplicări cu 3 - 6 l/ha	începând cu faza de 3 frunze până la compactarea ciorchinilor și după înflorit
Arbuști fructiferi	Pentru aprovizionarea cu fosfor, dezvoltarea sistemului radicular, echilibru energetic, influențează înfloritul, legarea fructelor, acumularea de zahăr în fructe	2 - 4 aplicări cu 3 - 6 l/ha	după formarea fructelor
Legume	Dezvoltare sistem radicular, vigurozitate ridicată, fortifică țesuturile plantei, favorizează transportul de energie în plantă	2 - 4 aplicări cu 3 - 6 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară

**Lebosol® România S.R.L.**

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition

