



Lebosol

Informații despre produs

Avitar®

Îngrășământ organic NK, lichid 4+2 pe bază de aminoacizi, alge marine (*Ascophyllum nodosum*), acizi humici, acizi fulvici

4,1 % Azot total (47 g/l N)

2,1 % Oxid de potasiu total (24 g/l K₂O)

Componente secundare:

0,19 % Sulf solubil în apă (2,2 g/l S)

0,3 % Sodiu solubil în apă (3,5 g/l Na)

25,8 % Materie organică

Valoarea pH-ului: 9,0 – 10,0

Plantele care nu primesc suficiente substanțe nutritive sunt mai vulnerabile la boli.

Fertilizarea foliară asigură un aport eficient și rapid de substanțe nutritive.

Cultura	Obiectiv	Recomandare	Momentul
La toate culturile	Creșterea toleranței la stres, creșterea și dezvoltarea sistemului radicular, echilibrul hidric, performanța fotosintetică, îmbunătățirea potențialului de producție	De 1 – 6 ori 2 – 5 l/ha (concentrație recomandată max. 2% pentru aplicări cu pompe manuale)	La nevoie
La toate culturile	Aport de nutrienți pentru o mai bună formare a rădăcinilor și dezvoltarea inițială	2 – 5 l/ tona de semințe (0,2 – 0,5 l/dt); soluție de hidratare a materialului săditor înainte de plantare - 1 %	Pentru tratarea semințelor/materialului de plantat
La toate culturile	Sprrijinirea managementului nutrienților și promovarea proceselor de conversie a resturilor vegetale	5 – 10 l/ha	La nevoie

Lebosol® România SRL

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 · loc. Afumați · județ Ilfov

+4021 310 6903 · office(at)lebosol.ro

sustainable plant nutrition



Cultura	Obiectiv	Recomandare	Momentul
La toate culturile	Întărirea toleranței la stres, îmbunătățirea randamentului culturii, echilibrul hidric, formarea rădăcinilor, performanța fotosintetică, reducerea stresului cauzat de radiații (antioxidant)	Fertirigare	Consultați specialistul dumneavoastră - doze orientative - 2 – 10 l/ha fertirigare
Cereale	Îmbunătățirea absorbției nutrienților și a toleranței la stres, eficiența azotului, vitalitatea	De 2 – 4 ori 2 – 4 l/ha	Din stadiul de 3 frunze
Cartofi	Absorbție îmbunătățită a nutrienților și toleranță la stres, vitalitate, calitatea frunzelor, dezvoltare juvenilă rapidă	De 2 – 4 ori 2 – 4 l/ha	Din stadiul de 6 frunze - pentru tratarea tuberculilor înainte de plantare - soluție 2 %
Leguminoase	Absorbție îmbunătățită a nutrienților, calitatea frunzelor și florilor, toleranță la stres, randament	De 1 – 2 ori 2 – 4 l/ha	Din stadiul de 6 frunze
Rapiță	Îmbunătățirea absorbției nutrienților și a toleranței la stres, reducerea stresului cauzat de radiații (antioxidant)	De 2 – 3 ori 2 – 4 l/ha	Din stadiul de 4 frunze
Porumb	Absorbție îmbunătățită a nutrienților și toleranță la stres, dezvoltare juvenilă rapidă	De 1 – 2 ori 2 – 4 l/ha	Din stadiul de 4 frunze
Floarea-soarelui	Absorbție îmbunătățită a nutrienților și toleranță la stres, reducerea stresului cauzat de radiații (antioxidant)	De 1 – 2 ori 2–4 l/ha	Din stadiul de 4 frunze
Căpșuni	Creșterea și dezvoltarea sistemului radicular și a plantelor, îmbunătățirea absorbției elementelor nutritive, legarea fructelor, calitatea, reducerea stresului cauzat de radiații (arsuri solare)	De 2 – 4 ori 2 – 4 l/ha	După plantare sau de la pornirea în vegetație
Fructe semănțoase	Legarea fructelor, coajă netedă, colorare, reducerea stresului cauzat de radiații (arsuri solare)	De 3 – 4 ori 4 – 6 l/ha	De la începutul înfloririi până la începutul maturării
Fructe sâmburoase	Legarea fructelor, calitatea, reducerea stresului cauzat de radiații (arsuri solare)	De 2 – 3 ori 3 – 5 l/ha	De la începutul înfloririi până la începutul maturării
Fructe de pădure	Creșterea și dezvoltarea sistemului radicular și a plantelor, îmbunătățirea absorbției elementelor nutritive, legarea fructelor, calitatea, reducerea stresului cauzat de radiații (arsuri solare)	De 2 – 3 ori 2 – 4 l/ha	De la pornirea în vegetație până la începutul maturării
Struguri de masă	Reducerea stresului abiotic, îmbunătățirea uniformității lăstarilor, ajută la alungirea rahisului, legarea boabelor (scade procentul de meiere și mărgeluire), îmbunătățește calitatea strugurilor	De 3 – 5 ori 2 – 4 l/ha	De la creșterea apariția inflorescențelor - începutul colorării
Citrice	Legarea fructelor, calitatea, reducerea stresului cauzat de radiații (arsuri solare)	De 2 – 4 ori 3 – 5 l/ha	De la buton alb până la recoltare



Cultura	Obiectiv	Recomandare	Momentul
Struguri de vin	Reducerea stresului abiotic, îmbunătățirea uniformității lăstarilor, legarea boabelor (scade procentul de meiere și mărgeluire), îmbunătățește calitatea strugurilor	De 3 – 5 ori 2 – 4 l/ha	De la creșterea inflorescențelor - începutul colorării
Legume în general	Creșterea și dezvoltarea sistemului radicular, îmbunătățirea absorbției nutrienților, dezvoltarea generală a plantei, crește calitatea florilor și procesul de legare, toleranță la stres, randamentul general al culturii	De 2 – 4 ori 2 – 4 l/ha (foliar)	După plantare (1 – 2 aplicări - fertilizare 2 – 10 l/ha), minim 2 frunze adevărate -> debutul recoltării (foliar)
Plante medicinale, plante aromatice și condimentare	Îmbunătățirea absorbției nutrienților, calitatea frunzelor și florilor, toleranță la stres, randament	De 1 – 3 ori 3 – 5 l/ha	După ce s-a dezvoltat suficientă masă foliară
Pomi de Crăciun	Îmbunătățirea absorbției nutrienților și a toleranței la stres, vitalitate, formarea rădăcinilor	De 1 – 3 ori 2 – 4 l/ha	De la înmugurire
Verdețuri	Îmbunătățirea absorbției nutrienților și a toleranței la stres, vitalitate, formarea rădăcinilor, regenerarea culturii	De 2 – 5 ori 3 – 5 l/ha	În tot timpul perioadei de vegetație
Bumbac	Îmbunătățirea absorbției nutrienților și a toleranței la stres, vitalitate, formarea rădăcinilor	De 2 – 4 ori 2 – 4 l/ha	De la înmugurire
Plante ornamentale și gazon	Îmbunătățirea absorbției nutrienților și a toleranței la stres, vitalitate, formarea rădăcinilor și regenerare rapidă	De 1 – 3 ori 200 – 300 ml (la 100 l soluție de stropit sau 2 – 4 l/ha)	După ce s-a dezvoltat suficientă masă foliară
Hamei	Îmbunătățirea absorbției nutrienților și a toleranței la stres, vitalitate, formarea rădăcinilor	De 3 – 5 ori 2 – 4 l/ha	De la înălțimea de creștere de 0,5 m

