

Lebosol®-QuadroS SC

Îngrășământ anorganic lichid simplu cu macroelemente

Îngrășământ cu oligoelemente în suspensie, S (+12)

12,2 % Mangan total sub formă de oxid de mangan (200 g/l Mn);

12,0 % Sulf total (200 g/l S);

6,0 % Zinc total sub formă de oxid de zinc (100 g/l Zn);

4,8 % Cupru total sub formă de oxichlorură de cupru (80 g/l Cu)

Culturile cu deficit de nutrienți vor fi mai sensibile la boli și stres abiotic. Fertilizarea foliară cu macro și microelemente va asigura o nutriție optimă a plantelor.

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
La toate culturile	Furnizare de cupru, mangan zinc și sulf plantelor, sporește calitatea aparatului foliar, echilibrează regimul hidric din plantă, îmbunătățește randamentul fotosintezei, reduce stresul cauzat de radiații (rol antioxidant), crește rezistența/toleranța plantelor la boli și stres biotic sau abiotic	1,5 – 3,0 l/ha (200 - 400 l apă/ha. Alte echipamente, cu soluție în concentrație de 0,2%	în caz de necesitate
	Furnizare de cupru, mangan zinc și sulf plantelor, sporește calitatea aparatului foliar, echilibrează regimul hidric din plantă, îmbunătățește randamentul fotosintezei, reduce stresul cauzat de radiații (rol antioxidant), crește rezistența/toleranța plantelor la boli și stres biotic sau abiotic	Prin fertirigare	Adresați-vă unui specialist!

Lebosol® România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Cereale păioase	Stimulează înfrățiitul, utilizarea eficientă a azotului, rezistență la iernare, oferă stabilitate + viabilitate, rezistență/toleranță la boli și stres, contribuie la fortificarea paiului, intensifică fotosinteza	1 - 3 aplicări cu 1,5 – 3,0 l/ha	toamna, începând cu stadiul de 3 frunze și primăvara la pornirea în vegetație
	Crește conținutul de proteină și calitatea boabelor, spor de producție, crește rezistența/toleranța la boli și stres	2 aplicări cu 1,5 – 3,0 l/ha	începând cu înspicatul
Rapiță	Rezistență la iernare, dezvoltă rezistența/toleranța la stres și boli, îmbunătățește randamentul fotosintezei, contribuie la creșterea și îmbunătățirea indicatorilor de calitate (conținut de ulei, MMB- ul etc.), utilizare eficientă a azotului (N), spor de producție	2 - 3 aplicări cu 1,5 - 3,0 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze până la începutul înfloriturii
Floarea-soarelui	Îmbunătățește randamentul fotosintezei, rezistență/toleranță la stres și boli, creșterea și îmbunătățirea indicatorilor de calitate (conținut de ulei, MMB- ul etc.), vigurozitate ridicată, productivitate	1 - 2 aplicări cu 1,5 – 3,0 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze până la începutul înfloriturii
Porumb	Oferă o mai bună toleranță/rezistență la stres, o mai bună vitalitate (ex: la frig), stimulează dezvoltarea de știuleți și a numărului de boabe/știulete, utilizare eficientă a azotului (N), stimulează înfloritul, spor de producție	1 - 2 aplicări cu 1,5 – 3,0 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Cartof	Îmbunătățește calitatea epidermei (coji), crește rezistența/toleranța plantelor la boli și stres biotic sau abiotic, disponibilitate mai bună a azotului, sporește vitalitatea	2 - 4 aplicări cu 2 - 3 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Leguminoase	Utilizare eficientă a azotului (N), intensifică procesul de fotosinteză, dezvoltă rezistență/toleranță la stres și boli, vitalitate (de ex: la rece), crește conținutul de proteină	1 - 2 aplicări cu 1,5 – 3,0 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze

Lebosol® România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Sfeclă de zahăr	Utilizarea eficientă a azotului (N), intensifică fotosinteza, crește rezistența/toleranța la stres și boli, susține dezvoltare rădăcinilor laterale, sporește conținutul de zahăr, spor de producție	1 - 2 aplicări cu 2 - 3 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Pășuni și plante furajere	Calitatea aparatului foliar, utilizarea mai bună a azotului, intensificarea fotosintezei, rezistența la iernare	2 - 5 aplicări cu 2 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Fructe semințoase	Îmbunătățește calitatea aparatului foliar, stimulează înfloritul, intensifică fotosinteza, reduce stresul cauzat de radiații (rol antioxidant), oferă rezistență/toleranță la boli, influență pozitivă asupra colorației fructelor	2 - 4 aplicări cu 2 l/ha	din stadiul de fructificare până la recoltare
Fructe sâmburoase	Îmbunătățește calitatea aparatului foliar, stimulează înfloritul, intensifică fotosinteza, reduce stresul cauzat de radiații (rol antioxidant), oferă rezistență/toleranță la boli, influență pozitivă asupra colorației fructelor	2 - 3 aplicări cu 2 l/ha	din stadiul de fructificare până la recoltare
Arbuști fructiferi	Calitatea aparatului foliar, intensificarea fotosintezei, reducerea stresului cauzat de radiații (rol antioxidant), rezistență/toleranță la boli și stres, influență pozitivă asupra colorației în roșu a fructelor	2 - 3 aplicări cu 2 - 3 l/ha	din stadiul de fructificare până la recoltare
Căpșun	Dezvoltarea inițială a tinerelor plante, asimilarea eficientă a azotului, vitalitate, rezistență/toleranță la stres și boli	2 - 4 aplicări cu 2 l/ha	începând cu stadiul de buton verde
Struguri de masă	Intensifică fotosinteza, calitate superioară a aparatului foliar, stimulează coacerea strugurilor, creșterea conținutului de zahăr, rezistență/toleranță la stres (îngheț, secetă) și boli, spor de producție	2 - 3 aplicări cu 2 l/ha	după înflorit și până la începutul intrării în pârgă
Struguri pentru vin	Îmbunătățește calitatea aparatului foliar, stimulează coacerea strugurilor, creșterea conținutului de zahăr, rezistență/toleranță la stres (îngheț, secetă) și boli	2 - 3 aplicări cu 2 l/ha	după înflorit și până la începutul intrării în pârgă
Legume	Dezvoltarea inițială a tinerelor plante, eficientizarea asimilării	2 - 4 aplicări cu 2 - 3 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară

Lebosol® România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24

077010 – Afumați, jud. Ilfov

Tel. +4021 310 69 03

office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
	azotului, vitalitate, rezistență/to- leranță la stres și boli		
Gazon și grădini	Calitatea aparatului foliar, utili- zare mai eficientă a azotului, vi- talitate, intensificarea fotosinte- zei, rezistența la iernare	2 - 5 aplicări cu 2 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Plante medicinale, aromatice și mirode- nii	Calitatea aparatului foliar, spor de producție, intensificarea foto- sintezei, creșterea toleranței la stres	2 - 4 aplicări cu 2 - 3 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Orez	Calitatea boabelor, utilizare mai eficientă a azotului, creșterea to- leranței la stres, fortifică siste- mul imunitar, îmbunătățește ca- litatea boabelor	2 - 3 aplicări cu 1,5 – 3,0 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze
Varză, verdețuri și ceapă	Asigură o calitate mai bună și crește productivitatea	2 - 3 aplicări cu 2 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Conifere	Aprovizionarea cu elemente nu- tritive,calitatea frunzelor acicu- lare, toleranță la stres, rezistență la iernare	2 - 3 aplicări cu 2 - 3 l/ha	în caz de necesitate

Lebosol® România S.R.L.

Str. Strada Nr. 2, nr. 24
077010 – Afumați, jud. Ilfov
Tel. +4021 310 69 03
office@lebosol.ro • www.lebosol.ro

sustainable plant nutrition

