



Лебозол®-Аквабор СП

суспензия

В, борат натрия, водорастворимый (133 г/л) – 10%
Na, натрий (56 г/л) – 4,2%

Плотность: 1,33 кг/л
Показатель pH: 6,0-8,0

9
продукты

Культура	Цель	Рекомендации	Сроки
Все культуры	Обеспечение бором, транспорт кальция, качество пыльцы, урожайность, фотосинтез, качество цветения, качество плодов	1-3 л/га	При необходимости. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га. При использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего раствора 0,5 %
Зерновые	Эффективность азота, качество цветения, завязывание плодов, зимостойкость	1-2 раза 0,5-1,0 л/га	с фазы 3-го листа
Бобовые (в т.ч. соя)	Завязывание плодов, жизнеспособность (например, при холоде), содержание белка	2 раза 1 л/га	с фазы 6-го листа
Ягодные кустарники	Завязывание плодов, качество кожуры, цветение, зимостойкость	1-3 раза 1 л/га	с начала роста побегов
Плодовые	Завязывание плодов, качество кожуры, цветение, зимостойкость	1-4 раза 1 л/га	с фазы розового бутона
Овощные	Качество листьев, профилактика некроза сердцевины, холодостойкость, равномерное созревание	1-3 раза 1-2 л/га	при формировании достаточной площади листьев
Рапс	Качество цветения, завязывание плодов	1-3 л/га	с фазы 4-го листа
Свекла сахарная, столовая	Урожайность, предотвращение гнили сердечка и сухой гнили	1-3 раза 1 л/га	с фазы 2-4 листьев до смыкания рядков