



Лебозол[®]-Цинк 700 СП

суспензия

Zn, оксид цинка (700 г/л) – 40 %

Плотность: 1,75 кг/л

Показатель pH: 8,0–9,0

Культура	Цель	Рекомендации	Срок
Все культуры	Обеспечение цинком	0,25-1 л/га	При необходимости. Расход рабочей жидкости не менее 200 л/га. При использовании ранцевого опрыскивателя концентрация рабочего раствора 0,25%.
Зерновые	Урожайность, эффективность азота, завязь плодов	1-2 раза 0,5-1 л/га	с фазы 3-го листа
Кукуруза	Урожайность, качество зерна	0,3-1 л/га	с фазы 4-го листа
Бобовые (в т.ч. соя)	Развитие на ранних стадиях, качество зерна, цветение, стрессоустойчивость	1-2 раза 0,3-1 л/га	с фазы 6-го листа
Подсолнечник	Урожайность, цветение, оплодотворение	0,3-1 л/га	с фазы 2-3 пар листьев
Плодовые	Развитие цветковой почки, стимуляция ростовых процессов, профилактика розеточности	2 раза 0,25 л/га	с начала завязи плодов до сбора урожая
Столовый, технический виноград	Качество цветения, закладка генеративных почек, завязь плодов, качество плодов и листьев	2 раза 0,25 л/га	с начала цветения до смыкания ягод